





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
6071/A/1






Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
6071/A/1



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
6071/A/1



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
0071/A/1



TALLER

DE

Encuadernación Rayado
y Libros en Blanco

DE

RICARDO SANCHEZ

Calle del Coronel N.º 41

MÁLAGA.



343

12

6071/A/1

N.

W.
Bianchi
12 May 02

Seminariū siue

PLANTARIUM EA-
rum arborum, quæ post hortos
conferi solent: quarum nomina,
fructus, itē etiam conferendi voca-
bula apud authores benè recepta
hoc libello declarantur.

In puerorū gratiam atque vtilitatem : vt
post ipsas herbas, etiā arbores cogno-
scere facile possint.



Castillo

Cū priuilegio.

Il est permis audict Robert Estienne
imprimer ledict petit liuret intitulé
le Seminarium arborū. Et defences
a tous autres de limprimer, ne ven-
dre autres que ceulx qui serōt faictz
par ledict Robert Estienne dedans
deux ans prochainement venans.
Faiet le sixiesme iour de May, M.
D. X X V I.

I I. De Mesmes.

3
Caroli Step̃ha-

NI SEMINARIUM, SI-
ue mauis appellare plantarium ea-
rum arborū, quas post hortos vul-
gus nostrum conferere solet.

Q VOD non potuimus eadē
opera pręstare statim post
absolutā hortuli nostri de-
scriptionē, tum propter va-
rias, quib⁹ auocabamur ac
distrahebamur occupationes, tū mul-
tō magis quia res videbatur nobis dif-
ficilior, quā vt temerē, & tā cito sine
aliquo iudicio prodire deberet: id nūc
iuuenibus nostris bonarum literarum
sectatoribus damus: quorū precibus,
(vt sunt sanē quam iustissimæ, & in-
genuis ac liberis animis dignissimæ)
omnino obtemperare in mētem in-
duximus: pręsertim in iis rebus, qui-

A. ij.

bus nostra ope ac diligentia, sua studia non parum ali atque augeri cognoscemus.

Habetis itaque candidissimi iuvenes hoc in libello variarum arborum seminarium, seu mauultis appellare plantarium: quod post ipsam hortorū ac rerum hortensium cognitionem iure quodā consequi videtur. Is enim vel antiquis ipsis mos fuit, ut post hortulum, atque adeò oblectamenta hortēsia, seminaria ipsa ob oculos proponerent, in quibus & vineas, & varias arbores disponebāt. Vnde & vitaria & arbuſtiua seminaria appellare licuit, pro vinetis & arbuſtis in ipsis hortorū oblectationibus inclusis: de quibus in ſequentibus abundè, & tamen breuiter differemus.

Sed prius quàm quicquam attente-
mus, ut omnia quæ hic explicaturi
ſumus, certum ordinem teneant, ne

quid confusum, aut inordinatū relin-
 quamus: prima omniū nobis explicā-
 da est seminarii & arbuti significatio:
 & quo pacto ab ipsis antiquis fieri so-
 lebant seminaria, quaque ratione no-
 stris respondeant: post quam explica-
 tionem, arborū omnium partes etiam
 pueris aperiemus: ab his, ad earum cul-
 turam digrediemur. Quo in loco per-
 multa eius rei vocabula à probatissi-
 mis authoribus vsurpata declarabi-
 mus, & in nostrū vtendi modum cō-
 uertemus. Postrema omnium erit no-
 minū eorum explicatio, quæ tum ar-
 boribus variis, tum etiā fruticibus im-
 posita sunt: quæ etiam vulgaria facie-
 mus, puerorū causa. Neque verò hac
 in parte omittemus varia fructuū vo-
 cabula pueris tam necessaria, quàm
 quæ omniū maxime esse debent. Ita-
 que, ne longiores simus, rē ipsam ag-
 grediamur: prius tamē admonito Le-

A. iij.

ctore, ne sibi imponi putet, nihil hîc
 esse, quod non à probatissimis autho-
 ribus desumptum sit, quorû etiam no-
 mina non tacebimus: & quibus intel-
 ligēdis haud minorem operam adhi-
 bere debebunt iuuentuli, quàm ipsis
 rebus. Nā & quæ ad antiquorum mo-
 rem spectabant in arborû culturæ vo-
 cabulis, & ipsarû cognominibus, quæ-
 que ab antiquis sumi debuerūt, ea me-
 hercule à Plinio, Varrone, Columel-
 la, Theophrasto desumpta sūt: vt no-
 ster hic libellus veluti quandam eo-
 rum authorum interpretationē hac
 in re iuuenibus bonarum literarû stu-
 diosis præbere videatur. Quæ verò à
 recentioribus sumenda erant, ea sane,
 vt rem ipsam fatear, néque mihi alte-
 rius inuentû arrogem, partim ab Her-
 molai Barbari commentariis in Dio-
 scoridem, partim ab eruditissimi viri
 Ioannis Ruellii vigiliis, in hûc libel-

lum transtuli. Fuit enim Ruellii nostri diligentia tam solers in primo libro eius operis, quod De natura stirpium inscripsit, ut vulgaria omnia arborum & fructuum nomina longe accuratiori stylo percurreret, quam nostro labore factum fuisset in priori nostri seminarii dispositione. Quapropter maluimus (non repugnante tamen authore) puerorum gratia institutum nostrum immutare, & grauem authorem in eius rei cognitione longe absolutissimum sequi: ac quod nobis in hac re conducere visum est, in summulam quādam & facilem ordinem redigere, quam nostrum laborem tanti viri diligentiae anteferre. Id autem factum videbitur in pomario.

A. liij.

Seminarium.

Quãdò omnis, vt inquit Cicero, quæ de aliqua re suscipitur institutio, à definitione proficisci debet, vt intelligatur quid sit id de quo à nobis disputatur: æquum est vt prius quàm quicquam aliud explicemus, quemadmodum superius paulò polliciti sumus: ipsam seminarij & plātarij, atque etiam arbusi significationem aperiamus.

Seminarium (inquit Budæus, singulare totius Galliæ ornamentū) locus est subactus, in quo semina aut vitium, aut arborum pangūtur, vt cum ad certam quantitatem excreuerint, in vinetum, vel arbusū, vel pomarium transferantur. Rustici quidam hodie vocāt vulgo *une bastardiere*. Columella lib. 3, Qui vineā vel arbusū cōstituere velit, seminaria prius facere debet. Sic enim sciet cuius generis vitē positurus sit. Nam quæ pretio parata disponitur, certam generositatis fidem nō habet: quoniam dubium est, an is qui vēdidit, legendis seminibus adhibuerit diligentiam.

Semina hoc loco, quemadmodum in alijs multis intelligi debent, non quidem pro granis, sed furculis depactis: qui cum radices egerunt, in seminarium aut vinetum transferuntur. vulgus nostrum vocat *des plātes*, præsertim in vineis: in arborib⁹ autē, *des saunageaulx*. Colum. lib. 5. cap. 9. de pomario, Semina lege crassa, non minus quàm manubriū bidentis, recta, læuia, procera, sine vlcibus, &c. Virg. - neu ferro læde retuso Semina.

Vnde eleganter dixit Columella, deponere semina scrobibus, *enterrer les sauuaigeaulx es fosses*: Cū (inquit) semina depones, dextra sinistrâque vsque in inū scrobē fasciculos sarmētorū brachij crassitudinis demittito. Quinetiā semina ipsa quādo in seminario ordine serebantur, à Columella ordinaria semina appellata sūt: hoc est per ordines disposita, lib. 3. cap. 13: Conlitis (inquit) pluribus inter ordinaria semina malleolis. Sed de cōsitione seminum, quæ per ordinem fiebat, suo loco.

Quin & huiusmodi semina interdum quidem plantæ dicūtur. Virg. Hic plantas tenero abscindens de corpore matrū Deposuit sulcis. Dicuntur & seminaria, plantaria. Virg. 2. Georg. Et viuaria plantaria terra. Plin. lib. 13. de palmis loquēs, Ergo (inquit) plantaria instituunt, anniculāsque transferunt, & iterum bimas. Itaque & plantariū & seminarium pro eodem accipi nihil vetat.

Seminarium autem id in quo tenella adhuc semina educanda (inquit Budæus) depanguntur deponūtūque, Plinius nutricem appellauit, lib. 16: Omnia ea (inquit) statim opus est nutrici dari, atque in seminarijs adulescere, iterūque migrare. Idem alibi, Quamobrem & seminarij curam antè conuenit dici, quā transeat in alia genera. Nam & huic principio eligi solum refert: quoniam & nutricem indulgentiorem esse quā matrem sæpe conuenit. Vnde illud Virgilij, Mutata ignorent subito ne semina matrem.

Itaque arbores dum furculis feruntur per ordinem, id est plātulis (quæ etiā Græcis τὰ σπέρματα vocantur, hoc est semina) conficiūt seminariū

& quasi surcularium quoddam. nam segetes fusim feri solent.

Iam & seminaria vlmorū dicere possumus pro vlmario, hoc est loco vlmis cōsito, & in quo multa vlmorū semina depacta sunt: *ung lieu auquel on nourrit & eslieue des petitx ormiers pour replanter ailleurs.* Colum. lib. 5. cap. 5, Id autē facile cōsequi poterit, si vlmorum seminariū paratū habuerit. Atque eadem quoque ratione seminaria pomorum, pro pomarijs, aut locis pomorū seminibus aspersis sumemus: cuiusmodi nonnulli nostratum instituere solent, vt Normani: appellāntque vulgo pepinaria, *des pepinieres*: præsertim cum ex granis pomorū aut pirorum consita sunt. nam etiam taleis terræ infixis conseri solent, quemadmodum ceraforū seminaria, quæ vulgus vocat *une cerisaye*: nos ceraseta vocare poterimus, vt satis in sequentibus suo loco declarabitur.

Porro tandiu dicuntur seminaria, quandiu ipsæ arborū plantæ, aut etiam ipsi surculi grandescere & adolescere incipiunt, vt iam possint aliō transferri: cuius rei rationem multis verbis explicat Columella lib. 5. cap. 5.

Cum autem percreuerunt ipsæ plantæ, vt iā nō amplius semina, sed arbores dici possint, aut arbusculæ, ac suo ordine in vnum locum cōsitæ sunt: non quidem seminariū sed arbustū efficiūt, siquidem locus ille varias arborum species contineat: cuiusmodi sunt ea loca quæ nostri vulgo appellāt vergeria, *des uergiers*. Arbusta etiā accipit Virgilius pro nemusculis vel etiam syluulis, quarū arbores defectæ sunt, vt iam amplius nullam umbrā præbeant, & arbusculæ potius quā arbores

dici possint: vulgus nostrū vocat *ung taillis*, in quibus per extremos æstus cicadæ maximū strepitū emittūt: vnde Virg. Resonāt arbuſta cicadę. Idē Non omnes arbuſta iuuāt humilēsque myricæ.

Quod si hæc quidem loca vel agrestia, vel etiā hortensia vnā tantum arboris speciē recipiāt, vel amœnitatis gratia, vel etiā vtilitatis: ea quidē ab eius arboris specie cuius consita sunt, nomē accipiēt, neque generalius arbuſti vocabulū habebūt. Amœnitatis quidē gratia, ab ilice arbore (quæ nobis satis est infrequēs: cuius tamen folia aquifoliæ ferē similia sunt, quam vulgus vocat, *du houx*, nisi quod nigriora & breuiora apparēt) ilicetū appellabimus, locum ilicibus consitum. Martialis, Vicini strues iliceti.

Sic etiam à salicibus salictum, *une saulſaye*. Varro, Idoneus locus eligendus vbi facias salictum & arundinetū. Vtilitatis autē gratia, vt ad olei prouentū, locū oleis arboribus consitum, oliuetū appellabimus, quod oletū antiquē Catoni dicitur, cuiusmodi multa loca videntur in Gallia Narbonensi. ad pomorum prouentum, pomarium: simili quoque ratione castanetum, cerasetum, & cætera huiusmodi, quæ pro consitarum arborum nominibus sua etiam nomina sortiri possunt.

Sed vt nostri seminarij significationē absolua-
mus, hoc vnū addere libet puerorū causa, Semina-
rij significationē à Cicerone elegantissime trāsfer-
ri ad fomitē, fontē, & originē alicuius rei: vel locū
in quo res aliqua incremētū cœpit, tam in bonū q̃
in malū. Itaq; ait in Pisonē, Ex illo fonte & semi-
nario triūphorū, cū arida folia laureæ retulisses.
Hoc est ex eo loco, è quo maximi triūphi & coro-

nae laureae reportari solent. Idem Off. lib. 1, Id autem est (inquit) principium urbis, & quasi seminarium Reip. hoc est, Hinc nostra Resp. duxit originem, & inde orta est. Idem oratione tertia in Catilinam, Qui nisi exeunt, nisi pereunt, etiam si Catilina perierit: scitote hoc in Rep. seminarium Catilinarium futurum. Hoc est, ab his pessimis nebulonibus scitote multos suborturos Catilinae similes, nisi auferantur.

Quod autem ad verba ipsius seminarii culturae propria spectat, dicitur à Columella lib. 5. cap. 8. coli seminarium bidetibus aut sarculis: cum ipsa terra in qua arborum semina disponere cupimus, à nobis subigitur & exaratur, siue etiam complanatur. Dicitur etiam runcari, & fodi eidem auctori: cum ipsa semina expurgantur, & radices fouentur denuo. Quinetiam quam frequentissime seminarium sarriri, & rastris excoli iubet idem Columella, cum herbae succrescentes, & inutiles rastris auferuntur: ne mitius terrae alimentum, quod tenellis adhuc radicibus educandis proprium esse debet, aliò transferatur. Multa alia vocabula sunt huic rei propria, quae in eum locum differre melius est, in quo de arborum culturae ratione, & nominibus singularim differemus. Superest nunc, ut nostrum ordinem sequamur: ac post explicatam seminarii significationem, arboris & fruticis nomina declaremus. Post haec autem ad earum partes digrediemur.

Arbor.

Arboris significationem ex Theophrasti capite

quinto libri primi de historia plantarū, ita desumemus: Arbor est, quod ab radice, caudice simplici, ramosum, nodosum, furculosum, haud facile dissolubile assurgit: vt olea, ficus, vitis. quæ omnia vocabula capite sequenti à nobis fusissime explicabuntur.

Arbores lætas appellauit Columella *beaulx arbres & bien cultinez*, quemadmodum Virgilius Lætatas segetes: hoc est opimas, elegantes, prosperas, & bene excultas: ne quis putet etiā feraces significare: Solent enim (inquit ille) etiam quantumuis lætæ arbores fructum non afferre.

Arbor pomifera, *arbre portant pommes ou poires, arbre frutier*: quæ mala fert atque etiam pira, quæ sub malorū & pomorum genere comprehenduntur: de quib⁹ Columella lib. 5. cap. 9. Ita quoque & arbor nouella, & arbor vetula dicitur, pro ea arbore quæ paucorum aut multorum iam annorum est. Cic. 5. de fin. Arborémque & vetulam & nouellam, & vigere & senescere. *ieune ou uieil arbre.*

Arbor quoque coliculū agere dicitur, *iefter une petite fouchette*, cū attollitur, & veluti corpus facit, neque dum fructum profert: sed tantum ipsum alimentum è terra attrahit, vt grādescat. Columella, Cum subactus ager, consitus non est, arbor coliculum agit. Frōdere etiam dicitur arbor, quemadmodum & florere, *faire branches, florir*, cum ramescit, & ramos effundit, ac veluti brachia quædam in altum expandere videtur. Col. lib. 5. cap. 9. Quem ita ponere cōuenit, vt si non periculum à pecore habeat, exiguus admodum supra scrobē

emineat: lætius enim frondet.

Luxuriare præterea dicitur arbor, quæ vberiores & diffusiores ramos producit, quàm par est. Columella, Cacumina virgarum & arborum ne luxurient, demutilato.

Arbusculæ eidē authori sunt, tenellæ adhuc arborū plātæ, & translationi, aut si mauis depositio ni, aut explātationi idoneæ: vulg⁹ vocat *des plates*, ou *des arbreaulx*. Colum. lib. 5. cap. 8, Excultæ quinquennio arbusculæ, habiles translationi sunt. Et paulo post, Ipsæ autem arbusculæ hoc modo possunt transferri. Antequam explantes arbusculam &c. Quo ex loco transferendarū & explantandarum arbuscularum rationem latius discito.

Arborescere dicuntur plantæ, vel etiā frutices (de quibus statim dicemus) dū in arboris magnitudinem & formam assurgunt: vires tamē ealdē neque robur tā validum habent, neque etiam interdum lignescunt: quēadmodū de malua refert Theophrastus, quæ mensibus senis aut septenis ita grandescit cultura, vt ab herbacea natura, ac forma discedere videatur, & in arborem transire: vt longitudine crassitudinēque instar hastæ possit attolli. Quapropter commode ad vsum baculi venit, quo bubulci & pastores utebantur ad compellendos greges. Vnde Virgilius.

Hædorūmque gregem viridi cōpellere hibisco.
Quod enim ait Theophrastus, puto de althea siue bismalua, vt vulgus vocat, intelligendū esse: quā Dioscorides ebilcū siue hibiscū appellat cū Virgilio.

Quinetiam virgulta & olera quædam etiā arborescere videntur, præsertim ea, inquit Theophra-

stus, quæ caudice vno consistunt: vt arboris quasi naturā adipisci spectetur, quemadmodū radix & ruta: & quidem fere omnia olerū genera, aut certe plurima, quasi ramos quosdam capeffunt, totāque in arboris figuram mutantur: quapropter oleri- arbores à quibusdam appellata sunt, hoc est olera arboreffentia: diu tamen durare nequeunt, neque hanc formam retinere.

Arbustiuus locus Columellæ lib. 3. cap. 13. dictus est pro loco arboribus confito, vtilitatis aut amœnitatis gratia, *ung lieu plante darbres*: qui etiā locus sub arbusti significatione intelligitur, vt prius dictū est. Col. lib. 5. cap. 5, Qui volet frequēs & dispositū arbustū paribus spatijs, fructuosūque habere, operā dabit, ne emortuis arborib⁹ rarefcat. Gellius arboretū vocat, lib. 17. cap. 2, Conualles (inquit) & arboreta magna erant. Arbustiux quoque vites ab arboribus dictæ sūt, quibus olim applicari & maritari ac iūgi solebant: vt etiam nūc solēt apud Italos. Col. Arbustiua vitē tam putare quā alligare diligēter oportet. Quod nomē deductū puto à verbo arbusto, arbustas: quod significat, agrū arboribus conferere ad maritandas vites. Plin. lib. 17. cap. 23, Transpadana Italia præter supradicta, cornu, populo, tilia, acere, orno, carpino, quercu, arbustat agros.

Arborator antiquis dictus est quemadmodū vinitor, is qui arborum colendarum & conferendarum curam & cognitionem ac scientiam habet. Col. lib. 11. cap. 1, Nam & arator reperitur aliquis bonus, & optimus fossor aut fœnifector, nec minus arborator aut vinitor.

Sed ne pueri verborum affinitate hallucinētur,

prius quàm ad arboris partes descendamus: dicendum nobis videtur, quid sit arbutus, quando simile quiddam cū arbusto habere videtur. Est igitur arbutus, arboris agrestis genus, mala acerrima ferentis, quæ dū matura sunt, fragorū formam & colorē referūt: Græci mimecyla vocāt: Narbonēses Galli, *des sarbousses*. Est autem fructus ceruis iucundissimus. Fruticosa quidem arbor est, & rarā vmbra præstans, potissimū in syluis. Vnde Virgilius, Et quæ vos rara viridis tegit arbutus vmbra. Eius fructū Plinius vnedonē appellat, quod asperitate sua & acerbitate, præsertim dum immaturi sunt fructus, plures edi non possint. Quidam etiā arbutum neutro genere pro fructu vsurpant, vt author est Valla. Sed & ipsam arborē Dioscorides, & Galenus comaron appellant. Quod nomē vulgus Italorum adhuc integrū retinuit: & fructū epymelida Græci vocauerunt: de quibus postea in sorbis. Videto Pliniū lib. 15. cap. 24. Virgilius 2. Georg. Dant arbuta syluæ. Sed hæc obiter.

FRUTEX autē Theophrasto dicitur id quod ab radice, caudice multiplici, ramosūmq; se attollit, vt rubus, paliurus: (quem tamen inter carduos cōiunxisse videtur Virgilius) Vnde fruticosæ etiā plātæ dicuntur, quæ sua natura nūquam in arborem attolluntur, aut arborescūt: sed statim ab ipsa radice sese in ramos diffindūt, & brachia attollunt: qualis est corylus, rhamnus, &c.

Suffrutices autem vocat Plinius, qui mediam quandam habent cōsistentiam inter arborem & fruticem: vel etiam inter herbam & fruticem: vt quatenus lignosi sunt, arbores aut frutices dici

possint: quatenus autem altius nō attolluntur, neque tam multos ramos habent, eōsque tenellos & deciduos, herbarum naturam imitentur: qualis est matiana, ligustrum, &c.

Fruticare dicuntur quædam arbores, quæ nisi sæpius purgentur & amputentur, à sua natura & forma desciscunt, & ab arboribus in frutices degenerant: qualis est myrtus, inquit Theophrastus. Dicuntur præterea herbæ quædam fruticare, quæ in frutices aut suffrutices attolli vidētur, & ramos multos producant: cuiusmodi est abrotonū vtrūque. Colum. Itaque cū trunco recisa, etiam lætius fruticat. Hoc est, vberius attollitur. Vnde frutetū Columellæ dicitur locus fruticibus conseptus, lib. 3. cap. 11: Quam ob causam (inquit) sylvestris ager præcipue est eligendus, qui etiam si frutetis aut arboribus obsessus est, facile extricatur. Sed de arboris & fruticis significatione hætenus. Nunc ad ipsas partes veniendum.

Partes arboris.

Incipiemus à radice, atque adeò inferioribus & maioribus arborum & fruticum partibus: deinde verò ad superiores, & minimas diuertemus.

Radix (inquit Theophrast⁹) tã in arbore quàm in alia quavis planta, est id quo alimētum à terra attrahitur. dicta, vt quibusdam placuit, quòd sæpe effossa terra parumper radatur, vt arbor fruticescat: vulgus nostrum vocat, *une racine*: cuius partes quædam circunquaque adhærentes quibus velu-

B. j.

ti lacertis nititur, & terram vndique comprehen-
dit, capillamenta appellantur. Col. lib. 4. cap. 11,
Qui non solum in eo errabant, quòd primi anni
capillamenta seminum intacta, sed & post bien-
nium viua radix recidenda erat. Vides quemad-
modum capillamenta, & viuā radicem separet.
Appellat autem viuam radicem, ipsius radicis
corpus, & veluti caudicē ipsum, qui quemadmo-
dū arbor ipsa, ramos suos habere conspicitur, vo-
catūrque à Columella lib. 4. cap. 8. mater, *la mai-
stresse racine*. Caueto autē ne pro viua radice vi-
uiradicē dicas: est enim aliud viuiradix, vt post-
ea explicabimus suo loco. Cæterum capillamen-
ta, seu capillos radicis dictos puto, tum ab ipsa
formæ similitudine, quam cum capillis nostris ha-
bent: tum etiam quòd quotannis attonderi sole-
ant, vt arbor crassescat, & maior succi copia sur-
sum attollatur, neque in ipsa radicis vsque adeò
multiplicis substantia hæreat. Quinetiam hæc
capillamēta Plinius fibras appellauit lib. 18: Fru-
menta, inquit, multa radican- tur fibris. Vnde fi-
broso herbarum potissimū radix, & capillata siue
capillaris dicitur apud authores, ad differentiam
radicis bulbosæ, hoc est rotūdæ, & quæ bulbi simi-
litudinem habet. Dicitur item radix limosa, quæ
dum frangitur, succum quendam limosum emit-
tit: vel quòd terræ substantiam ita resoluit, vt
semper limo obducta appareat. Est præterea ca-
uernosa radix, quæ multas intus cauernulas ha-
bet, & quodammodo foraminulenta est, neque so-
lida & compacta apparet. Addendum est etiam,
radicem geniculatam ab authoribus vocari, quæ

nodosa est, & multos veluti geniculos profert, qualis est polygonati radix, quod vocamus sigillū Salomonis: item etiā corticosam, quæ corticem habere videtur. Plin. lib. 20. cap. 19, Syluestriū vnum genus, ceratitim vocant, nigrum, cubitali altitudine, radice crassa & corticosa. Quin & nomina radicum ab ipsa forma fingi possunt, vt crassam, longam, spissam, breuem radicem dicamus, quæ admodum à colore & sapore potissimū sumi solent aliā differentia.

Radicare autē dicuntur arbores vel etiam plantæ, cum ipsius radicis beneficio crescere videtur, vt est in priori exemplo Plinij. Eadē quoque ratione dicitur arbor capere radicem, *prēdre racine*, quando succū terræ sibi familiarem facit, & ipsum attrahit, atque in alimoniam conuertit. Plin. Cum pali defixi radices cepissent. Idem lib. 17. cap. 23, In terra nō pauciores gēmae quatuor obruuntur ad radicem capiendā. Qua etiam loquendi forma, dicitur arbor eidē authori lib. 16. cap. 31. agere radices in profundum: hoc est penitus radicare. Legi præterea apud Plinium, circūfodere radicē & subarare, pro circūfodiendo & subarando auellere & extrahere. Quod si radix rūpatur, & suo loco moueatur, propriē admodum luxata radix dicitur. Plinij locus sic habet lib. 17. cap. 24, Aut circūfossor, vel etiā subarator imprudens luxauit radices. Quinetiam mittere radicē, pro capere radicē, vel producere & exerere, Columella dixit lib. 3. cap. 18: Nam (inquit) & radices ē capite, quā recisum est, æque mittit.

Caudex siue codex (nam vtrunque antiqui pro-

B. ij.

tulerunt, quemadmodum saurex & forex) dicitur in arboribus & fruticibus id quod ab radice supra terram simplex assurgit: estque commune pariter annuis ac perpetuis arboribus, inquit Theophrastus. *la souche*. potestque dici caudex ipsius arboris corpus, quemadmodum caulis ipsarum herbarum: dicunturque caudices aut caules, quādiu ipsa arbor aut herba recta stat: nam quod ex caule aut caudice defecatur: id quidē non caudex aut caulis, sed pars caulis aut candicis appellabitur. Quanquā tamen antiqui tabulas ligneas in quibus inclusa cæra erat ad aliquid stilo describendum, vel etiam omnino caudiceas, & ex caudicum partibus leuigatis & tenuioribus factis compositas, codices siue codicillos appellaue-
runt: quod ex arborū codicibus vel codicum partibus tenuioribus, nempe membranulis & tuni-
culis fieri solerent. Quod nomen apud nos quoque in eadem significatione remansit, frequentissimūque est apud authores. Est præterea animaduertendum antiquos pluriū tabularū contextum, cuiusmodi in nauibus vel ædificijs conspici-
mus, codicem appellauisse. Vnde Appiū Claudiū Caudicem primum cognominatum putant, quod eiusmodi contextus rationem primus inuenisset. sed vereor, ne sint hæc præter institutum.

Truncus autem (vt ad rem redeamus) *le tronc*, dicitur pars caudicis, vel etiam caudex ipse ramis truncatis superstans: nisi mauis interpretari trūcum partem caudicis, radici viciniorē, quæ crassior apparet. Col. lib. 4. cap. 8, Quoniam si iuxta truncum radicem præcideris, ex cicatrice plures enascentur. Quinetiam truncum pro arbore quæ

trāsfertur ex seminario, sumpsit idem author lib. 5. cap. 9: Truncus (inquit) aptior translationi est, qui brachij crassitudinem habet.

Si verò arbor inutili quadam fruticatione multos veluti caudices emittere videatur, cuiusmodi solent cerasus, prunus, corylus: tantū is caudex iuste appellabitur, qui est medius & robustior: alij autem vicini ab eadē radice prodeuntes, qui quidem defecari & transplantari solēt, vt arbor crassior sit, & ne soboles luxurians parentem enecet, stolones appellantur: vulgus nostrum reiectos vocat, *des reiections*. à quibus inquit Varro lib. 1. de re Rust. cap. 2, Licinius Stolo prim⁹ cognominatus est, quòd null⁹ in eius fundo reperiri posset stolo: effodiebat enim circum arbores è radicibus, quæ nascerentur è solo, quos stolones appellabant. vocantur etiam huiuscemodi stolones, soboles, ab olefcēdo. Col. lib. 5. cap. 8, Omnis deinde soboles quæ ex vno stirpe nata est, quotannis extirpanda. In vineis autem appellantur pampini: vnde quāpinare vites, superfluos stolones refecare, quod etiā ad arbores cōuenire posset: de quibus postea.

Pullos etiam arborum vocat Cato cap. 51, quos reiectos vulgo vocamus vel, *des pions*: Ab arbore (inquit) abs terra pulli qui nascētur, eos in terram deprimito. Pullulos quoque eosdē vocauit Plini⁹ lib. 17, Nullis verò tales pulluli proueniunt, nisi quarū radices amore solis in summa tellure spantiantur. Atque inde pullulare verbum deductum, quasi pullulos emittere, quod & pullulascere dixit Columella libro 4. cap. 21. *repionner*.

Sed ne caudicis partes omittamus, prius quàm

B. iij.

ad ramos transeamus, sciendum est caudicem constare ligno, cortice, tunica, & humore siue medulla interna, quæ matrix dicitur.

Lignum, est pars arboris interna, præcipue in caudice, quæ fissilis est & dura, *du boys*: estque veluti caro ipsarum arborum: vnde lignescere dicuntur plantæ quædam, atque adeò radices, quæ in ligni duritiem concresecunt & siccantur: qualis est raphani radix, & caulis ferulæ, atque etiam thapsiæ, quæ lignosum caulem proferre dicuntur.

Pectines à Plinio dicuntur in arboribus, & earum materia, per longitudinem rectæ pectinum modo lineæ, & interualla, quæ Græcis *κτιδόνες* appellantur. In quibus autem arboribus variant pectinum illorū lineæ & interualla, adijcere Plinius solet aliquid, quo varietas illa possit indicari, obliquos, crispas, nodososve pectines appellās.

Cortex, pars superior & vltima, atque ab ipso subiecto corpore separabilis: estque veluti corium & operculum, ac crusta quædam ipsarum arborum & plantarum. Virg. Ruptus de subere cortex, *une escorce*. Vnde decorticare, & excorticare arborē dicimus. atque hic quidem cortex quibusdam arboribus lævis, quibusdam rugosior apparet: cuius diminutiuo, corticula, vsus est Columella lib. 12. cap. 47.

Liber autem dicitur cortex interior, ipsi ligno adhærens. Col. lib. 5. cap. 10, Ita librum arboris inolescere finito. Virgilius tenuē tunicam appellat in Georg. Et tenues, inquit, rumpunt tunicas. Ac paulo post, Vdōque docent inolescere libro. Vnde libri appellati, qui ex tuniculis illis arborum interioribus primū confici solebant. Hinc

etiam delibrare arborem apud Columellā, hoc est, vsque ad corticem interiorem diffindere, vt crassior postea euadat.

Matrix Theophrasto dicitur, quòd in medio ligni vel caudicis tertium à cortice continetur, quæ à nonnullis cor, ab alijs medulla appellatur. *le cuer de l'arbre*. Quin & pulpā in arboribus id vocat Plinius lib. 16. cap. 38. quod nos in animalium corporibus musculum appellamus.

Lachryma verò est is humor, qui statim desecto caudice vel ramo, aut aliquibus tātū, ipso ligno, profilit & apparet: vulgus vocat *la sene*. Vnde lachrymantes calamos, hoc est taleas quæ inferi solent, vocat Plinius lib. 17. cap. 14, & in proœmio lib. 23, lachrymā vitis vocat, quæ veluti gūmi est.

Musculus, Græcis brion (quanquam etiam brion populi candidæ vuam significet) alijs splāchnos, alijs ipnos dicitur: vulgus nostrum vocat *de la mouffe*, est id quod in ipsa corticis arborum quarundā superficie lanuginosum apparet, ceu canī quidam ipsarum arborum villi.

Rami sunt (inquit Theophrastus) qui à caule vel caudice fissi, multiplices sparguntur, quos nonnullis placuit nodos appellare: sūntque veluti quædam ipsarum arborum brachia, quibus sese latius diffundunt & expandunt, atque in altum attolluntur. Vnde Virgilius,

Tum fortes late ramos & brachia tendens.

Quod alibi dicit, frondes explicans, ipsas frondes pro ramis ponēs: cum tamē frōs proprie dicatur, id quod ipse ramus circunquaque producit: multa interdū folia habens, & nōnihil corticis, ac veluti

B. iiii.

caudiculi. Vnde frōdosus ramus dictus est Liviō decimo ad vrbe condita: & frondea corona, quæ multis frōdibus laureis, vel hæderaceis, foliosis cōtexta est: ramis enim contexi corona non dicitur. Hinc etiam frondare arbores dicimus, pro frōdes amputare & leuare: hoc est ramos arborū expurgare, & inutilem frondium propagationem exsecare. Virg. - omne leuandū Fronde nemus. Hoc est frondibus spoliādū. Quod munus qui exequēbātur, frondatores appellati sunt: & frondaria fiscina, in qua expurgatæ & defectæ frondes reponēbantur. Col. Cum frondere cœperunt cacumina fici, ferro summa prodest amputare. Idem lib. 5. cap. 8, Lætā frondē olea nō inducet. eleganter, pro vberē frondem non producet. Quod Cicero primo Tuscul. quæst. frondescere dixit: Cælum (inquit) nīfescere, arbores frondescere. hoc est, in frondes abire, & frondibus vestiri.

Ramus autem arboris cū fructu decerptus, termes appellatur. Horat. Nunquam fallētis termes oliuæ. Vnde terminare verbum deductum, quoniam antiqui diuisiones agrorū, priusquā metæ inuentæ essent, termitibus signabant. Gellius tamen lib. 2. spadicem vocauit, auulsum ē palma termitem cum ipso fructu. Itaque spadicis nomen proprium ipsi palmæ erit, quemadmodum palmes ipsarum vitium.

Tabulata dicuntur rami effusiores, & in plana tendentes, nō in altiora crescentes: quales in plantanis potissimum & vlmis conspiciuntur. Virg. Summāsque sequi tabulata per vlmos.

Surculus, est id indiuiduū Theophrasto, & sim.

plex, quod ex ramis vel caudice oritur, qui etiam frondes gerit: nihil enim prohibet quin ramus, & frōdes & surculos producat. Græcis autem, κλάδος dicitur, quale præcipue (inquit Theophrast⁹) germen annotinum apparet. Vnde surculosi rami Plinio appellantur, surculis referti.

Malleolus, surculus est utrinque capitatus è duro. Cic. de Senect. Malleoli, plantæ, sarmenta, vites, traduces, &c. Columella malleolarem virgam appellat, quam ait non amplius quàm sex gēmarum esse debere. gemma autem quid sit, quid item malleolus, draco, &c. in vineto nostro latius docebimus: hæc enim ad vitem magis pertinent vocabula.

Oculi in arborum surculis dicuntur, vnde germen producant, siue germinant, *des boutons*: atque hinc inoculatio quam proprie emplastrationem vocat Columella, cum oculus surculi aperitur, ut alterius arboris oculum intus inseramus: cuius rei ratio sequenti capite diffusius à nobis explicabitur.

Gemma, idem quod oculus. frequentius autē est apud rusticos: quod nomen ut formarent translatione sumpta à lapillis pretiosis, necessitas coegit, inquit Quintilianus lib. 8. & Cicero 3. de Oratore. Virg. Et læto turgent in palmite gēmæ. Itaque gemma si in arboribus sit, vulgus nostrum vocabit, *des boutons*: & gemmare arbores dicet vulgus *boutōner*: quod & gemmas agere dicit Columella lib. 6. & gemmascere lib. 5. cap. 10. Vnde bigemmes & trigemmes palmites appellat. Si autem in vitibus fuerit gemma, vulgus nostrum appellabit

ung bourion: & gēmare vites dicit, *bouriōner*: quod Virgilius dicit trudere gemmas, 2. Georgicorum, Sed trudit gemmas, & frondes explicat omneis.

Germen autem est id quod ex ipsis arborū surculis primo vere exit, ex quo deinde folium producit. nam gemma proprie floris est, quāquam vtrūque confundatur. Plin. Densante se frondiū germine. Vnde germinare dicūtur arbores primo vere, cum germina emittunt. Columella, Primo vere ante quā germinent arbores, deponito: ac ne tinea molesta sit seminibus ficulneis, in imum scrobem demittito.

Folium, est id in planta vel arbore, quod humore & carne constans, ipsam arborem vel plantam vestit atque exornat: quod Græci *φύλλον* appellāt, sine quo, arbores ipsæ & plantæ propemodū nudæ apparēt, vt cū folia deciderunt per autumnū. Vnde folia agere dicitur arbor, cum folia producit. Colum. Simulatque folia agere cœperint fic⁹. Quinetiam dicitur proprie Plinio lib. 15. cap. 29. folium patulum, minutum, densum: *large, menue, espesse feuille*.

Pediculus verò siue petiolus, est id quo folium, flos, vel fructus dependet, *la queue*. Plin. Tutiores sunt fungi cum carne cocti, aut cum pediculo piri. Columella, Cum iam matura mala fuerint, ante quā rumpantur, petiolos, quibus pendent, in-torqueto.

Flos, ipsarum arborum & plantarum gaudium, vnde postea fructus oritur: estque id, inquit Theophrastus, quod ipsis plantis & arboribus à natura accommodatur ad fructum, *la fleur*. Vnde florere

& florescere dicuntur ipsæ arbores, cum vere nouo flores emittunt, & conspicuæ apparent.

Fructus quid sit omnes norunt, constatque carne & semine, atque etiã cute, quam vulgo appellamus *peleure*, Plini⁹ putamē vocat lib. 15. cap. 22: Sola, inquit, differētia generum in putamine duro fragilīve & tenui, loculoso & simplici. Sed à fructu, fructificare & fructiferæ arbores dicuntur, quæ fructum emittunt, decidēte prius flore. Quo in loco pueris id obiter aperiam, eleganter & propriè dici, arbores fructu indui, cum fructum emittunt, & palmites fructibus onustos gerunt: Colum. lib. 5. cap. 5, Quia quòd pars palmitis præcipitata est, fructu induitur. Qua ratione etiã terra segetibus indui dicitur apud Pliniũ. Virg. 1. Georg. - cū se nux plurima syluis Induer in florem. Hoc est, florem emittet & florescet. Quin & ex arboribus ipsis fructu onustis, colligere fructũ & decerpere fructum, eleganter dicimus: atque etiam percipere fructum ex ipsis. Plinius lib. 15. cap. 1, Hesiodus negauit oleæ satorem, fructum ex ea percepisse quenquam. Item etiam fructu arborem spoliare, dicere possumus, & eleganter.

Sed quoniam quædam sunt peculiaria parturiētis arboris indicia, quæ nec fructus, nec floris nomen habere videntur, de ijs etiam cum fructibus nobis est dicendum.

Cachrys Græcis, Latinis (inquit Hermol. Barbarus) amētum, sunt sublonga panicularum modo nucamenta, quæ squamatim compacta propēdent è ramis. Crescunt autem potissimum hyeme, & vere dehiscunt in flauescētes squamulas,

& prodeunte folio pergunt: qualia in larice, picea, platano, iuglande, tilia, abiete, & alijs permultis videre licet.

Gallæ autē à Græcis κηκίδες dictæ, arboribus omnibus glandiferis cōmunes tātum & propriæ sunt, cuiusmodi sunt quercus. *noix de galle.*

Iulus, auellanæ nuci vel corylo proprius. éstque id quod veluti prælōgus vermis, singulari pediculo pensile nititur, & fructum præcedit. Plin. lib. 32. cap. 29, Ferunt & auellanæ iulos suos compactili callo, ad nihil vtilis.

Paniculæ, inquit Barbarus, sunt veluti nucamēta quædam quæ in ramis arborum, resinam fundētium, callo squamatim cōpactili dependent: vt in larice & picea arbore: cui paniculæ vice floris insunt, easque Græci κίτλαρες appellant. Plin. lib. 10. cap. 10, E ramis picearum arborum, instar panicularum, nucamenta squamatim compacta dependent. Panicularum enim nomine significatur ferè quæcunque sublonga vel subrotunda tumescunt effigie. Hinc comas etiam milij, panici, arundinis quoque, paniculas appellat idem Plinius, quas Græci antheles vocant.

Nucamenta verò generalius quiddā sunt, quàm paniculæ, & propriā sunt arborū *nucis ferentiū*: dicta nucamēta, vel quòd apertissime in nucibus propendere videntur, inquit Ruellius: vel quòd sunt ceu rudimēta quædā naturæ, pineam nucem facere condiscantis: ea etiam κίτλα Græcis dicuntur. Cætera quæ ad fructus arborū pertinent suo loco, nempe post arborum nomina declarabuntur, vt instituimus. Sed iam redeamus ad eas

partes arborū quæ superfunt declarandæ: quam tamen nescio, an tam iuste partes appellari debeant, quàm eæ quæ superius explicatæ: nā hæ etiam interdū arbuscularum nomen promeretur.

Viuiradices, inquit Budæus, dicuntur plantulæ arborum, cum sua radice translata, Græci φιλιω-
τήρια vocant. Col. lib. 3. cap. 3, Vt non inuiti H s. 600. nummis singulis, singula millia viuiradicis à me rustici mercetur. Plin. lib. 17. cap. 23, In arbus-
sto è prædictis sola viuiradicis ratio.

Tradux, traducis, viuiradix vel planta aut semē arboris, vel etiam vitis, aliò inde tractum & propagatum. Colum. lib. 5, Si tradux traducem non contingit, media virga inter eas deligetur.

Talea, frustum ligni aut arboris, vt oleæ vel salicis, præcisum ex vtraque parte, vt in terrā depōnatur. Varro. 1. de re rust. cap. 40, Demū in oleagineis seminibus arbores videndū vt sit de tenero ramo ex vtraque parte æquabiliter præcisum, quas alij clauolas, alij taleas appellant. Ita enim quædam arbores conseri solent, nempe taleis cubitali vel pedali magnitudine vtrinque præcisis, quæ Græcis ξύλοι, vulgo plantalia dicuntur. vulgus nostrum vocat *ung troncon*. Et serere taleis *affier par troncons*. Plin. lib. 17. cap. 17, Myrtus & taleis feritur: morus talea tantum, &c. Quo in loco multa de talearū satū videre poteris. Col. lib. 5. cap. 9, Taleæ deinde sesquipedales ferra præci-
dantur, atque earum plagæ vtraque parte leuentur.

Calamus autem appellatur id quod ramo alicuius arboris inferere solemus, *une greffe*. Plin. lib. 17. cap. 14, Ideo lachrymantes calamos inferi non

oportet. Vnde vulgare vocabulum apud Italos, incalmare, pro inferere, *enter*. Calamus alioqui tessera siue tessella, appellatur Plinio: Quidam, inquit, huic generi miscuere fissuram in vitibus exempta cortice tessella, surculo à latere plano adigendo. Columella insitum appellat lib. 4. cap. 29, Cum quod ex insito profundit, subligandum.

Virgulta appellat Virgilius, quæ quibusdam vulgò plantalia, alijs femina appellari placuit: nonnulli etiam palmites vocant: nempe surculos eos qui terræ committuntur, vt in arborem insurgant:

-quæcūque (inqt ille) promes virgulta per agros, Sparge fimo pingui. Virgas interdum appellant Plinius & Columella, interdum etiā virgas malleolares.

Stirpes arborū dicuntur quæ sua sponte proueniunt, inquit Columella, lib. 3. cap. 17, Sūntque veluti palmites solidiores & trunci. Virgilius, Inde vbi iam validis amplexæ stirpibus vltimos Exierint. Vnde stirpare & extirpare verba. Colum. Omnis deinde soboles, quæ ex vno stirpe nata est, quotannis extirpanda est. & stirpitis aduerbium, quasi radicitus.

Turiones Columellæ dicūtur, teneritates summaturū ipsarum arborum, quæ singulis annis crescunt. vulgus nostrum vocat *des syons*.

Flagella verò dicuntur cymæ arborum, & ipsarum summæ partes, quæ ad cuiuscunque vëti flatum mouentur: vnde etiam nomen traxerunt ab eo, quòd flatibus petantur. *le menu boys du feste de l'arbre*. Virg. -néve flagella Summa pete.

Sed hæc de partibus arborum, quæ potuimus adsequi, sint satis: plura qui volet, ab ipsis authoribus petat: difficillimum est enim vnius diligentiam id præstare posse, quòd alioqui multorum labor consequi solet. Nunc ad vocabula, ipsarum arborum culturam & ornatum ac curam exprimèntia, descendamus: vt pueri saltem dum probatos authores legent, omnia quæ de hac re tractabuntur, facilius intelligant. Post hæc autem ad ipsarum arborum nomina & fructus, sermonem transferemus.

Vocabula ad ar- BORVM CULTVRAM & insitionem pertinentia.

Fuerit & hæc quidē pars, nostro iudicio, pueris admodum necessaria, tum ad probatos authores intelligendos, tum etiam ad faciliorem & magis absolutam eius rei, quæ de arboribus tractat, cognitionē. Neque enim id æquū nobis esse videtur, pueris arborū nomina tradere, pri⁹ quàm & quid sit arbor, & quæ sint arboris partes, quæ etiam sint vocabula arborum culturæ propria, cōpertissima habeant: perinde enim esset, ac si rei alicuius nomē probe tenerent, rei autē ipsius naturā & vsum propemodum ignorarent. Nam quid quæso esset ineptius, quàm rhetorices aut dialectices nomina cognoscere, ipsarū verò artium vsum ac rationem incompertam habere? Id enim etiam vulgus

imperitum nouit. Mallem utique, atque id quidē
 utilius mihi videretur, rei alicuius vsum, vel vtē-
 di rationem callere, ipso tamē nomine ignorato.
 Atqui nō ita nobiscum agetur: nam etiam nomi-
 na ipsa arborum describemus. Sed præponenda
 est, vt dixi, ipsarum conferendarum ratio: non ta-
 men res ipsa, ne putetis: nam agricolæ nō sumus.
 Præterea multos habetis, qui id fusissime tracta-
 uerūt: sed tantum vocabula, quibus vtuntur ij qui
 rei ipsius rationem conscripserunt. Itaque rem
 aggrediamur, & ab ipsa arborū dispositione in-
 cipiamus, quam veteres obseruauerunt.

Serere arbores, *planter*. Columella, Arbores ra-
 ris interuallis serito. Has enim certo ordine sere-
 bant antiqui, quemadmodum hodie quoque ob-
 seruari videmus, non solum oblectamenti gratia,
 sed vt liberius & æquale terræ alimentū recipiāt:
 & rami se in vacuum nō extendant. Vnde illud
 Virgilij 2. Georg.

Omnia sint paribus numeris dimensa viarum,
 Non animum modo vti pascat prospectus inanē,
 Sed quia non aliter vires dabit omnibus æquas
 Terra, nec in vacuū poterunt se extendere rami.
 Itaque per ordinem, & paribus mēsuris dispo-
 nantur arbores in seminario, & certis interuallis
 ipsos ordines distinguebāt, quæ illi interordinia
 appellarunt. Serere etiam plantare dicitur. Plin.
 lib. 17. cap. 10, Hoc modo, inquit, plantantur puni-
 cæ. nam & planta eidem authori pro viuiradice
 vel semine lumitur, lib. 17. cap. 15: Satiuæ (inquit)
 plātæ, syluestrium radicibus inserūtur, natura sic-
 cioribus, syluestres plantas appellat, quas vulgus

nostrum vocat *des sauvaigaulx*. Satiuas autem, *des plantes frâches*. Sed & illud omittendum non est, figere humo plâtas feraces, apud Virgiliū quarto Georgicorum, eleganter id significare quod vulgus nostrum dicit *affier, ou afficher, ou piquer des plantes fertiles*. Quod etiam ponere dixisse videtur Columella lib. II. cap. 2, Plantâsque vlmorum (inquit) nunc ponere vtile est.

Metare arbores aut vineas, est disponere, & certis mēsuris atque etiam ordinibus serere: vulgus nostrum vocat *reōner*: nā ordines ipsos, appellat, *des reons*: & interordinia, *des reses*: solū autē ipsū, *le guerret*. Vnde metatores dicebātur ipsis antiquis qui arbores ita disponebāt, *des reōneurs*. Plin. lib. 18. cap. 33, Hunc oliueti metator vergiliarū quadratio, hunc caueat insitor calamis, gemnīsq̃ue inoculator. Quę duo postrema vocabula nūc primum declarabimus. Vnde etiam vinearum metatio dicta Columellæ lib. 4, Hæc (inquit) in quincuncem vinearum metatio expeditissima ratione conficitur.



Disponere autem arbores, vel etiam vites in quincuncē, *reonner les arbres ou sauvaigaulx en ordre de cinq a cinq par bōne mesure, ou en eschicquier*, est (inquit Baysius) quando secundi ordinis arbores ad primas paribus interuallis sic disponūtur, vt figuram quincuncialem seruare adinuicem videantur. Plin. lib. 17. cap. 11, In disponendis arboribus arbutisq̃ue ac vineis, quincuncialis ordinum ratio vulgata & necessaria: non perflatu modo vtilis, verum & aspectu grata, quocunque modo intueare, in ordinem se porrigente versu.

C. J.



Est autem figura quincūcialis, eius figuræ quæ decussim antiquis signi-
ficabat, media: fiebat autē decussis ad X literæ figurā, quæ figura apud latinos decē significat: atque hæc quidē si per mediū secetur, remanebit V figura, quæ quinariū numerū, atque adeo quincūcem demonstrat. Sed hæc quidem multoties tū superi⁹, tum etiā inferius multiplicata figurā facit, quæ quincuncialis appellatur, vt in margine descriptum vides. Itaque

DEVNX.

QVINCUNX.



QVINCUNCIALIS ORDO.



ordines in quincuncem dispositi, æqualium laterum trianguli rationem seruant, & obliqui: non autem directi apparent. Cæsar lib. 7, Ante hos obliquis ordinibus in quincuncē dispositis, scrobes trium in altitudinem pedū fodiebantur. Scinditur enim terra (inquit Columella libro quarto) more noualium, transuersis aduersisque sulcis, dū vitis per denos pedes in quincuncem disponitur. Quo in loco multis verbis explicatam poteris legere disponendarū in quincuncē arborum rationem, & quo pacto spatia & interordinia fieri debeant: & creta, aut purpura, vel alio quouis colore conspicuo signari, ea propemodum forma, quæ

superiori figura descripta est. Itaque falli plurimū videntur qui quincuncem directis ordinibus fieri debere putant. Neque verò audiendi sunt, qui duo loca proferunt in suam sententiam: alterum Ciceronis in Catone Maiore: alterū Quintiliani lib. 8. cap. 3. nam ea quidem ita intelligi non debent, quemadmodum ipsi autumant, vt statim ostendemus. Locus Ciceronis sic habet, de Cyri regis Persarum delicijs: Cum, inquit, admiraretur Lysander, & proceritates arborum, & directos in quincuncem ordines, &c. Hoc est, rectē dispositos, non autem ad rectam lineam ordinatos. Sed & Quintiliani locus sic etiam habet, vbi de orationis ornatu scribit, sumpta metaphora ab ipsarum arborum in quincūcem dispositione: Quid enim (inquit) illo quincunce speciosius, qui in quācunque partem spectaueris, rectus est? &c. Non ita sanē legunt antiquiores & emendati codices. Sed hoc pacto potius, Quid enim illo quincunce speciosius? Quid in quācunque partē spectaueris, rectius? Hoc est ordinatius, & magis rectē dispositum: non autem, ad rectam lineam, vt illi putant: quanquam & obliqua & transuersa figura rectis lineis componantur. Non ibo tamen inficias quin quincuncis figura etiam alio pacto sumi & intelligi possit: cuius rei admonuit nos Lazarus Baysius, incredibilis eruditionis vir, atque id ex Volusij Metiani auctoris antiquissimi sententia: cuius de quincunce opinio est, vt quinque pūctis figuretur hoc pacto, Quod si verum est, profecto conserendarū in quincūcē arborum rationē ita intelligemus, vt

C. ij.

plures huiusmodi quin-
cunces in longum pro-
ducti, vnum ordinem fa-
cerent: interordiniū au-
tē appellaretur, id quod
inter ipsos ordines re-
ctum vtrinque conspi-
ciebatur, vt est in proxi-
ma figura.

Circunfodere arbores
aut vites, est cum, æstate potissimum, aridā iā ter-
ram, neque satis humidam, circunquaque effo-
dimus vsque ad ipsas radices, atque huius ablatae
terræ loco humidiores & crassiores iniicimus,
præsertim in ijs arboribus, quæ per hyemē abla-
queatae nō fuerant. Vulgus rusticorum vocat, *bes-
cher au pied, ou beschetter a l'etour des racines*. Colum.
lib. II. cap. 2, Arbores quoque tēpus est ablaquea-
tas circunfodere & operire. Plin. lib. 17. cap. 18,
Circūfodi autem omnibus annis à solstitio duūm
cubitorum. Vnde circunfossor apud eundem, &
circunfossura: Cupressus, inquit eodem loco, cap.
26, aspernatur circunfossuram.

Circummunire plantas arborum caueis, est ip-
sas plantas vel spinis vel palis circumpositis mu-
nire, & sepire ne à pecore corrodantur, & boves,
ipsas corrumpant, *encaiger ou entourer les plantes
despines, ou aultres choses de peur des bestes*. Colum.
lib. 5. cap. 8, Optimum est etiam constitutas plan-
tas circummunire caueis: deinde constitutum
iam & maturum oliuetum in duas partes diuide-
re, quæ alternis annis fructu induantur.

Ablaqueare arbores, *deschausser*, est hyeme potissimum, terra defossa, superuacuas radices quæ per æstatem succreuerāt, abscindere, ne inutili propagatione succum ipsi matri necessarium eripiant: cuius rei rationem & modum latissime docet Columella lib. 4. cap. 8. Dicta ablaqueatio à lacubus siue lacusculis, qui fiunt dum ipsas radices amputamus. Colum. loco superiori, Aut (inquit) hyemalis, quæ ex pluuijs cōsistit, in lacusculis ablaqueationis aqua, brumæ congelationibus noua vulnera peruret. Plinius, Myrrha gaudet rastris & ablaqueationibus. Cæterum orbem ablaqueationis appellat Columella, fossuram siue fossionē illam, quæ circū ipsam arborem in orbem fieri solet, lib. 4. cap. 4: Nā dum exaltare (inquit) fortius orbem ablaqueationis fossor studet, obliquam vi-tem plerunque sauciat.

Aggerare arbores, vel etiam aggerare terram circa arbores, est quum post hyemē, instante iam æstate, terram circumfundimus, & veluti circummunimus ipsas arbores optima terra, ne calore nimio radices exarescant: vulgus nostrum vocat *rechausser*. Colum. Omnes arbores fructiferae circumfossæ aggerari debent. Idem de arboribus, Stercoratam terram circā aggerato. Idem lib. II: cap. 2. operire pro eodem sumere videtur: Arbores quoque (inquit) tempus est ablaqueatas circūfodere & operire. Idem ibidem, adobruere pro eodem sumpsit: Omnes (inquit) arbores quæ fuerant in segete, circūfodere & adobruere oportet. Hoc est terra multa sepelire, vt nō appareāt trūci
Facere scrobem, aut fodere, est foueas facere, in

C. iij.

quibus arborum surculi depangantur, & demittantur in seminario. *faire les fosses pour planter & picquer des saunageaulx.* Columella lib. 5. cap. 9, At si eodem anno & scrobem facere, & arbores ferere voles: minimum ante duos menses scrobes foudito. Virgilius subigere scrobes dixit. Cato autē cap. 27. dixit inuertere scrobes, pro eodem: Scrobes, inquit, inuertito oleis, vlmis, vitibus. Sunt autem scrobes, fossiones siue foueæ intra terram manufactæ, ad vineas, vel arbores conferendas. Vnde scrobiculi per diminutionem, *petites fosses.* Plin. lib. 21, Atque in scrobiculis seruntur, hominis facie circumfusi. Incilia vero (vt hoc etiā obiter dicamus, quando sese offert ipsa res) sunt fossæ ad deducendam circa ipsas arbores aquam factæ, quas ab elicienda aqua, dictas fuisse inciles fossas Festus autumat. Vnde incilia excitare, pro huiusmodi foueas facere, dixit Columella lib. 3. cap. 11: Si olea (inquit) in cliuo sit, incilia excitentur, quæ limosam aquam ad radicem deferant.

Delibrare arbores aut vites, dicuntur agricolæ, cum ipsum corticem aut exesum, aut aridum, & vermibus, aut alio quopiam vitio inquinatū, tollunt, vt melius ipsæ quasi sordibus liberatæ cōualescant. Colum. lib. 4. cap. 24, Cortex quoque aridus fissusque per summa trūci depēdens, corpore tenuis delibrandus est, *escorcer, oster la peleur.*

Surculare plantas vel arbores, est surculos adnascētes ex ipsis arboribus adimere, & taleas præcidere ex nouellis ramis, quas seminario cōserere possimus. *tailler des cyons, ou des troncs pour planter, ou afficher ailleurs.* Col. lib. 5. cap. 9, Atque etiā

rigandæ sunt plantæ, cū siccitates inceserunt, nec nisi post biennium ferro tangēdæ: ac primo surculari debent, ita vt simplex stylus altitudinē maximi scrobis excedat. Quo loco quidā, & fortassis rectius, legunt sarculari, hoc est sarculo purgari, quod est instrumentum rusticum. Idem tamen author lib. 12. cap. 47, insecare pro surcolare, sumpsisse videtur: Quidam (inquit) oleas non contundunt, sed acuta falce insecant. *ilz la taillent avec la sarpe*. Nam falcis rusticæ figura propemodum eadem est cum instrumento vinitorio, quod vulgus nostrum vocat *une sarpe*. Cuius descriptionē & figuram Columella recensuit lib. 4. cap. 25.

Frōdare arbores, *esbrancher*: fitque interdū utilitatis gratia: nempe vt agricola ex frondibus arborum superuacuis manipulos faciat: interdum etiam vt arbores ipsæ frondium multitudine nō obruantur, & fructum vberiore ferre possint. Virgilius fronde leuare dixit: Omne (inquit) leuandum Frōde nemus. Hoc est, frondibus superuacuis spoliandū. Hinc frondator dictus, inquit Seruius, qui arbores amputat, & è frondibus manipulos facit hyemis tempore, animalibus ad pastum offerendos. Plinius lib. 18. cap. 31, Vnus frōdator, quatuor frōdarias fiscinas cōplere in diem iustū habet. Hinc etiam frondatio dicta, ipsa frōdium amputatio. Columella, Atque in frondatione (inquit) cauendum, ne prolixiores pollices fiant, qui ex amputatis virgis relinquuntur.

Attondere & interraderē arbores vel vites, est luxurie cōprimendæ causa, cacumina flagellorū confringere: sic enim loquitur Columella lib. 4.

C. iiii.

cap. 27, Qua ratione firmiores (inquit) arbores & feraciores fiunt. Plinius, Oleæ attendantur, sicut & vites, atque etiam interradi gaudet. Quod interlegere dixisse videtur Virgilius, & frōdes manibus carpere:

Ipsa acie (inquit) falcis nondū tentāda, sed vncis Carpendæ manibus frondes, interque legendæ. Quod etiamnum interpurgare dixisse videtur Plinius lib. 18. cap. 26, Ficus interpurgari, seminaria fieri, &c. Decacuminare etiā dixit Columella lib. 5. cap. 6, Decacuminanda, inquit, est iuxta ramulum, qui videtur nitidissimus.

Castrare arbores, vel arundineta, aut vites: est, inquit Columella, intercidere & disrarare. Ait enim lib. 4. cap. 32, Sed illud de integro refodi debet, hoc potest intercidi & disrarari. quod opus rustici castrationem vocant: Plinius deputationē videtur appellare lib. 17. & Cato cap. 50: interputationem. Vnde etiā putare arbusculas dixit Columella: Arbusculæque (inquit) ficorū in seminarijs putari, & ad singulos stylos redigi debent. vulgus nostrum vocat, *esmonder*.

Exturbare arborem, est herbas quæ circumquaque adnascuntur, auellere: vt melius terræ alimentum capiat, *curer*. Hoc verbo vtitur Columella lib. 4. cap. 31. Quod & farrire dixit Plinius lib. 17. capite decimo.

Interlucare ramos arborum, dixit Plinius lib. 17. cap. 23. pro eo quod est, ramos seu germina inutiliter pullulantia cum interuallo refecare: vt solem & lucem alij rami possint recipere: quod vul

gus nostrum vocat *bailler iour, ou bailler sollaige*. Et à luce deductum videtur vocabulum, quòd locus vnde cæduntur rami vacuus, lucem alijs ramis præbeat. vel quòd decidantur vel intercidantur rami lumini officientes. Vnde interlucatio apud eundem cap. 27: Interlucatio (inquit) arboribus prodest, sed omnium annorum trucidatio inutilissima. Eadem etiam collucatio dicitur. Colum. lib. 2. cap. 22, Neque terram aperire, neque arborem collucare. Collucationem in sylvis profanis fieri Varro refert, cum rami recidebantur officientes lumini, vel etiam interdum ipsæ arbores. *effarter*. Cato cap. 139, Lucum collucare Romano more sic oportet.

Cædere arbores, *couper*: hoc est, refecare, eruere, præcidere, & ex ijs detrahare quod nobis vtile futurum speramus cum percreuerunt, vel ad asseres ex pyris & nucibus aut quercubus faciendos, vel etiam ad materias domuū & ædificiorū. Colum. lib. 4. cap. 21, Si culta, quarto demū anno cæditur. Vnde titulus est apud Palladium, De materie cædenda. Id etiam Varroni detruncare dictum est: hoc est, vsque ad truncum refecare.

Transferre arbores ex seminario in arbustū, est quod vulgus nostrum transplantare dicit, *transplanter*. Plinius lib. 17. cap. 11, Plātas ex seminario transferre in aliud, prius quàm suo loco ponātur, operose præcipi arbitror. Ibidem, In arbustum quinquennes sub vrbe transferūt. Hinc traduces dictæ pro seminibus, quæ traducuntur & transferuntur: de quibus superius in partibus arborum. Nunc ad insitionem veniendum.

Inserere arbores, est surculo vnus arboris ingeniose detracto, & in aliam cōmisso ac conglutinato, ipsarum arborum naturam ita immutare, vt eas veluti cogere videamur, tales fructus producere, quales surculorum natura proferre solet: vulgus nostrum appellat *enter*. Itali, vt prius diximus, à calamis qui inseruntur sumpto vocabulo, incalmare dicunt. Plinius, Semine quoque inferre natura docuit, &c. Vnde etiam insitum appellat idem author, *une ente*: Quædam (inquit) in plantario insita, eodē die transferuntur. Fit autem hæc insitio hodie duplici ratione, quam etiam refert Plinius lib. 17. cap. 14, Aut enim trūcus arboris leniter finditur cuneo tenui, fissuram custodiēte admoto, donec cuspidatim decisus descendat in rimam calamus: atque hæc quidem inserendarum arborū ratio vulgo vocatur, *enter en fente*: aut etiam inter corticem lignūque surculus inferebatur, qui primus insitionis mos fuit: qui hodie quoque dicitur, *enter en esorce*. Sed de varijs arborum insitionibus videto Columellam lib. 5. cap. 11.

Alia est præterea inferendarum arborum ratio, quam Plinius & Columella inoculationem vocant: nempe cum gemmam vel oculum vnus arboris includimus in sinum & nodum gemmæ alterius, expulso cortice. vulgus nostrum vocat, *enter en bouton*. Inoculatio, inquit Plinius, rores amat lenes.

Est & alia insitio, quam emplastrationem vocant superiores authores: atque hanc scutulatam

insitionem appellare possumus ex Plinio. Vnde etiam vulgus vocat *enter en escussion*: exēpta enim scutula, inquit ille, (sic enim vocat quod postea emplastrum dixit) cortici, imprimitur ex alia cortex par, cum sui germinis mamma: sic compage densata, vt cicatrici locus non sit. Atque hæc quidem emplastri ratio, inquit idem, ex inoculatione nata videri potest: crasso tamen maxime cortici conuenit, neque paruis & minutis arboribus propria est, & æstate potissimum fieri solet: aliæ autem duæ insitiones, hyeme vel vere. Columella tamen libro 5. cap. 11, eandem esse inoculationem cum emplastratione contēdit: Plinius verò Fertilissima (inquit) omnium inoculatio, postea emplastratio: & inserere firmissimū, fœcundiūque quàm serere.

Neque verò omittenda est serendarum arborum ratio, quæ taleis fieri solet. Est igitur taleis serere, quod vulgus rusticorum dicit *picquer ou afficher*. Sunt enim arbores permultæ quæ ita feri gaudent: quemadmodum oliuæ, salices, & huiusmodi. Vnde inhumare taleas, *enterrer les plâtes*: & dimittere taleas, *coucher les cyons*, dixit Plinius. Præterea, muscum talearum radici circundare, *mettre de la mousse autour de la racine*. Atque hæc de arborū culturæ vocabulis sint satis. Plura qui volet, ex ipsis authoribus colligat. Nunc ad ipsa arborum & fructuum nomina veniendum.

Pomarium.

Requirat etiam hæc pars suum ordinem, ne quid indistinctum aut indispositum sit, quapropter puerorum ingenia confundi atque etiam offendi possint. Ipsa igitur arborum & fructuum nomina explicaturis (quæ res ut est sane difficilissima, ita facilem & benignum lectoris animum expostulat) dicendum erit nobis de arboribus fructiferis, quæ, ut inquit Plinius libro 12. cap. 3. in incolarum numero esse cœpere: hoc est, cœperunt excoli & conseri apud nos, utilitatis & fructuum gratia. Atque ut id quidem faciliori dicendi ordine persequamur, faciemus primum pomarium, in quo per certos ordines, varias arborum fructiferarum species disponemus: quarum nominibus explicatis, statim etiâ fructus ostendentur: alienum enim esset fructus ipsos à suis arboribus secernere. Exinde verò poterimus oliuetum è pomario diuidere, quando rei difficultas & necessitas expostulat: cui tamen ficetum coniungemus prius quam de moris, cornis & mespilis à nobis dicatur. Veniendū postea erit ad nuces, post quarū explicationē, seminariū nostrum claudendum erit. Nam castanetū in syluam differemus: post quam etiam frutetum subnectemus. In eam verò syluā maiorū arborū nomina referēda erūt, & quæ in syluis potissimū ac nemoribus crescere solēt: quā statim absoluto seminario, post vinetū tamen, sumus vobis daturi. Salictum verò post pratum vo-

bis dabitur: nam is est salictio commodior locus.

Sed prius quàm pomarium nostrum aggrediamur, hoc vnũ vos admonebo, æqui vt sitis & beneuoli: neque vero mihi id vitio detis, si quando vel per imprudentiam, vel fortassis ignorantiam (fatendum est enim quicquid in homine est) aberrauero: aut si interdum Latinis Gallicæ dictiones non tam eleganter respondebunt, quàm fortassis cuiquã vestrum videbitur. Id si acciderit vt animaduerratis, faciles vos esse velim, neque tam cito obstrepere, vt calumniatorum potius quàm studiosorum nomẽ incurratis. Tam est enim difficile omnibus ingenijs in hac re satisfacere, quàm difficile & laboriosum esset, velle incertissima quæque omnibus certissima facere. Audebimus tamen, neque quẽque audiemus, qui dicat, ea nos à bonis authoribus desumpsisse, & doctorum diligentia plurimum adiutos, laudem ex aliorũ laboribus & vigilijs captare velle. Eant illi, & sibi tantum inuideant: non etiã alijs. Quicquid enim à bonis authoribus desumpsimus, id quidem non fatebimur modo, verumetiam ipsos tãquam authores adducemus. Quicquid doctorum diligentia & labor nobis præstitit, ceu ijs quibus per ætatem iudicium nondum est satis expurgatum: id ne tacebimus quidem, atque ipsis etiam inuitis gratiam referemus: adscripto dignitatis & honoris nomine. Quod si fortassis tam rusticus tãque syluanus, vt sic dicam, fuerit quispiam, vt etiam nominis sui & authoritatis grauitatem nolit omnibus prostitui, taceat per me licet, & sua veluti arcana quædam apud se contineat, aut ipse scri-

bat, & suam sibi gloriā suis vigilijs paret. Quin-
etiam ijs suo colloquio, sua eruditione, quantum
volet, interdicat, quorum ingenijs plurimum pro-
desse putet. Qui tamē animus, utinam in viro li-
terato nō esset, in quo nihil modestiæ desyderari
alioqui deberet. Sed iam ad nostrum pomariū.

Pomarium quid sit, ferē omnes norunt: est enim
locus pomis arboribus consitus: & in quo semina
pomorum depangūtur. *une pommeraye.* Columella
lib. 5. cap. 10, Locum pomarij prius quā semina
feras, circumuenire macerij oportet. Pomorū
autem nomine, non solum arbores, mala dulcia fe-
rentes, quas nostri vocant *des pommiers*: neque tā-
tūm mala ipsa dulcia aut acerba comprehendun-
tur: sed etiam arbores omnes, fructus rotundos fe-
rentes. item fructus ipsi, siue molli, siue etiam du-
riori putamine contecti fuerint. Plinius de nuci-
bus, Solum hoc (inquit) pomum natura compa-
ctili operimento clausit. Itaque pomaria, non so-
lum loca significabunt, malis dulcibus consita, &
quibus mali nomen solis conuenit: sed etiam alijs
fructibus, ut persicis, pyris, & id genus. Columel-
la, Curandum est (inquit) ut quam generosissimis
pyris pomaria conseramus. Erunt igitur poma-
ria, loca amoenitatis gratia, varijs arboribus, fru-
ctus etiam varios & orbiculatos ferentibus, con-
sita: qualia erāt Athlantis, de quibus Ouidius 4.
Metamorphoseos, *maillans le bonQ. animon*
Id metuens, solidis pomaria clauserat Athlas
Moenibus. Quorum studiosissimus & diligētissi-
mus cultor fuerat etiam Alcinous rex Pheacum.
Vnde Alcinoi syluā, Virgilius in Georgicis pro
pomarijs dicit. Pomariorum insuper nomine, ut

ipsam significationē absoluamus, locus intelligitur in quo poma reponuntur, *le guernier aux pomes*: Plinius, Pomaria in loco frigido ac sicco contabulari, septētrionalibus fenestris sereno die patere, &c. Græci oporothecā appellant. Varro 1. de re rustica, cap. 59, Et ideo oporothecas qui faciunt, ad aquilonem ut fenestras habeant, atque ut aere perflentur, curant.

Sed ne quis dictionum vicinitate, & veluti consonantia decipiatur, ut pro pomario pomœrium dicat: sciat ex Liuiο pomœrium, locum esse circum murum, quē in condendis urbibus quondam Hetrusci, quā murum ducturi erant, certis circa terminis inangurato conscribebāt. Vnde Festus pomœrium dictum putat, quasi promurum, id est proximum muro: Varro autem, quod esset post murū, dictum pomœrium autumat, Liuij sententiam sequēs, Nā & hoc (inquit Liuius) spatium quod neque habitari, neque arari fas erat, non magis quod post murum esset, quā quod murus post id, pomœriū Romani appellarūt. Redeamus ad nostras arbores & fructus, quos nostra ætate in pomarijs reperimus.

INCIPIEMVS à malo arbore, quæ Græcis melea dicitur, *ung pōmier*: cuius fructus malū appellatur: Græcis melō, *une pōme*: sumitque varias secū appellationes tū à forma, tū etiā à sapore, & locis in quibus crescit, ut postea declarabimus.

Pomī autem nomē (inquit Barbarus) generalius est, cōplectiturque quicquid apud Græcos opora cōtinet: hoc est quicquid nihil habet exterius lignosum: nam ea quæ exterius lignosa sunt, Græci

acrodrya vocant : qualia sunt, malum punicum, pistacia, castaneæ, nuces, & id genus permulta. Vtrūque autem genus salgami nomine complectuntur Latini, à quo salgamanus. Servio poma dicuntur, quæcūque corio molliore tecta sunt, in quo à nucibus differunt, de quibus suo loco. Pomum autem dictū Varro putat, quia potu siccitatibus indigeat: ac de pomo arbore intelligit: nam fœminino genere si proferatur, quemadmodum & malus & pyrus, arborem denotat: si autem neutro, fructum ipsum: vt hoc etiam puero- rum causa dictum sit. Inordinata folia sunt pomis, inquit Plinius lib. 16.

Malorum igitur nomine complectemur omnes illos fructus, quos vulgo vocamus *des pōmes*, hoc est, quicquid id quod esus est, foris habet: nisi quid aliud addatur, significationis gratia, vel à sapore desumptū, vel à loco, vel etiā à figura. de quibus differētijs proximum est vt dicamus: non tamen omnibus, ne quis decipiatur: nam omnes recensere, infiniti propemodum esset laboris: præterea sua quæque lingua, propria malorum vocabula habet. quæ qui enumerare omnia conaretur, eadem opera & maris arenam & astra ipsa enumerauerit. Conabimur tamen, & in hoc diligentiam omnem adhibebimus, vt quæ ex Plinio & Columella animaduertimus in vsum nostrum cadere, hic adscribamus, omiſſis tamen locorum differentiis, quòd eæ & infinitæ sint, & omnium minus necessariae.

Malorum gene-

RA ET DIFFERENTIAE.

Malus arbor vulgo nota, quæ Græcis, ut prius iam dictum est, *melea* dicitur, *ung pommier*, à pomis ferendis: cuius descriptionem ex Theophrasto, Plinio, & recentioribus doctissimis, ut Barbaro & Ruellio, desumito. Mihi satis fuerit, pueris explicasse, malum serotinam appellari, quam vulgus vocat, *pommier tardif*: item malum præcoccem, quæ vulgò dicitur, *pommier hastif*: quæ etiam verna Latinis dicta est, hoc est quæ ferè ipso vere fructus edit, & celerrimè omniū fructus perfert. Itē malus bifera dicta, quòd bis ipso anno fructū ferat, *pommier de deux portees*: malus agrestis, *pommier sauvage*: malus generosa, *pommier frâc*: malus insitata, *pommier enté*: & cætera id genus. Sed ad fructus:

Malorum antiquis plura fuerunt genera, tum à saporibus, tum etiam ab ipsis inuentoribus petita. Nobis autem pomorum differentiarum prope modum innumeræ, etsi enim veteres (inquit Ruellius) hæc genera malorum annotauerint, posteritas tamen miscella insitione antiquitatem longè vicit. Sed quia hæc res non parum cōferre videtur nostris iuuenibus, quibus operam damus: commodū est ut primū aliquot antiqua pomorum nomina à Plinio, Columella, & alijs desumpta, explicemus: deinde verò vulgaria nostra describamus, prius quàm ad alias malorum differentias descendamus. quem ordinem in ipsis py-

D.j.

ris postea sumus obseruaturi suo loco.

Poma serica, siue syrica, quæ & zizipha Columellæ & Galeno dicuntur, parui succi sunt, nec coctionis facilis, itaque stomacho ingrata: sunt enim agrestia, & in spinosa arbore, albæ spinæ ferè simili nascentia: quæ quidem Narbonensibus Gallis vulgo dicitur, *ung guindowlier*, Græcis autem seris. fructum vero ipsum, vulgus Narbonensium vocat, *des guindoules*. frequentissima sunt huiuscemodi poma circa famatissimum pontem, quæ S. Spiritus appellant. Officinæ barbaros imitata, *iuinbas* hodie nominant: suntque ea poma (inquit Barbarus) baccis similia quàm malis: ac primum in castris, Augusti temporibus ex Africa allata.

Poma lanata peculiari nomine (inquit Plinius) dicta, quod obducta lanugine essent super ipso cortice, quemadmodum struthia & persica, de quibus postea: nulla alia commendatione insignia: frequentissima in agro Veronensi. His fortassis non erunt dissimilia, quæ etiã Græci à lanugine chnodia appellant. Virgilius,

Ipse ego cana legam tenera lanugine mala.

Poma antiquitus quædam ab inuentoribus nomina traxerunt, ut à Mælio, Manliana: à Matio, Matiana: item etiã Claudiana, quibus color est rubens, à Claudio inuētore nomē sumpserunt: quæadmodum ab Appio Appiana, siue melappia: quibus odor & magnitudo est cotoneorum: quod ea primus Appius à Claudia gente in cotoneam malum inseuerit. Cætera apud Plinium videre poteris lib. 15. cap. 14. Melapia autem quidam à dulcedine, vel ab apibus nomē traxisse putant, quemadmodum vnam apianam siue apiam, quod præ dulce

st
dine & saporis iucūditate apes ijs pomis & vuīs
frequēter insideāt, & hinc sua mella captent. Hu-
iūscemodi autē poma hodie vulgus Romanorū
adhuc vocat, *mela pi*: sūnt que mediocri magnitu-
dine cū calamilis, de quibus postea dicemus. sapo-
rē iucundissimum præ se ferunt etiā in cortice, vt
execti corticis putaminibus prunis superposi-
tis, Romani odorē cubiculis optimū cōciliare &
inducere soleant: quod sane tā elegāter non fit de
calamilorū corticibus. Cæterū ipsa melapia car-
nem habēt mellitæ dulcedinis, & succi dulcissimi
plenā: qua ratione plurimū à matronis expetunt.

A patria & locis in quibus, nascūtur, potissimū
quædā poma nomē traxere, vt pelusiana, delphi-
ca, tiburtina, camerina, siue (vt Columella volu-
it) amerina, græcula: Græci Corinthiaca à Sidun-
te vico celebrant, de quibus postea dicemus.

Cætera verò à causis ipsis germanitatis nomen
habent: vt cohærentia, gemella, nunquam in foetu
singula, *pōmes geumelles*: vel gemella etiā à folijs: fo-
lium enim vnum, aliquādo & geminum erumpit
è latere medio: quæ tamen quidam belgemela,
siue melgemela vocant.

Poma conditiua vocat Cato, quæ dolijs condū-
tur, *pommes de garde*: quæ & scantiana eidem au-
thori vocari videntur.

Poma orbiculata, à figura orbis in rotunditatē
circūacti, inquit Varro & Columella: quēadmo-
dum à mammæ effigie orthomastica: à cōdi-
tione castrati seminis spadonia: à corrugationis
celeritate pannucea, quæ quamcitissime in rugas
abeunt: ab importuno tumore pulmonea, stolide

D.ij.

enim tumescunt & mille alia id genus, quæ Plinius suprâ scripto loco numerat.

Sunt & parua ingrati saporis, atque etiam odore acutiora, peculiari acerbitatis improbitatisque conuitio, inquit Barbarus. Quibus vis tanta, ut etiam aciem gladij perstringant: vulgus nostrum vocat, *pommes destranguillon*, *pommes de boys*: quæ eadem austerâ vocare possumus.

Poma lapidosa eadem ratione à Columella vocata, quæ etiam pyra calculosa dicuntur: nempe in quorum parte interna, quidam veluti calculi & lapilli inueniuntur. Columella lib. 10,

-lapidosi obruta pomis Terra. *pômes pierrenses*.

Mitia poma, matura, siue domestica, & dulcia, atque in tempore collecta, *pommes franches*, ou *pômes meures*. Virgilius,

-sunt nobis mitia poma Castaneæ molles, &c.

Mitescere enim poma dicuntur in arbore, siue etiam alibi, quæ maturescunt, & in tempore matura fiunt. Plinius, Reliquorum pomorum maturitas cito mitescientium transuolat.

Sunt & parua quædam poma gratissimi saporis, quæ petisia nominantur, inquit Plinius. Fortassis ijs proxima & similia, quæ vulgò paradisiaca dicta sunt, quasi cælitus missa: sunt enim præparua, mellea dulcedine, præcoci celeritate, quasi verna, concretu pauco.

Et quandò iâ ad nostratia & vulgaria nomina pomorum deuenimus, æquum est ut ea breui compendio percurramus, omittis antiquis nominibus: quæ ut infinita sunt, ita infinitam propemodum diligentiam requirunt.

POMORVM omniū quæ apud nos reperiuntur, longè commendatissima sunt, quæ vulgò Capenduta vocantur, *de courpendu*: fortassis curtipendia siue curtipenda appellanda, à pediculi, è quo dependent, breuitate: vt ipsi veluti arbori inhærere videantur, & è ramis sine pediculo prodire. Itali Calamila appellant, quasi omnium optima: præsertim circa Romā & Bononiam. Nam Veneti corrupte Calamania vocant. Saporis sūt admodū iucundi, & odoris gratissimi, in tanta suauitate minime fugacia, magnitudine media, colore, cum maturuerunt, luteo. Cætera petito apud Ruelliū.

Proxima sunt illis & viribꝯ & sapore, quæ vulgo ratelliana dicuntur, *pommes de rateau*: præterquam quòd maculas rubiginosas tam frequentes non habent, & partem soli apertam, ostendunt rubicundio rem.

Ad hæc etiā non parū accedere videtur quæ renetia vulgus vocat, *pômes de renette*. Sed carnē nō habēt eousque solidā, & paulo dulciore sūt gustu.

Alia sunt ijs non inferiora sapore, sed prægrādia, rotunda, callo fragili, tenero, quæ in Ambianensi municipio (inquit Ruelli⁹) vulgus *rambura* nominat: mira sunt & suauitate gustus, & teneritudine, ita vt in ore frustra liquecant.

Accedūt quæ passipoma vocātur, *des passépômes*, quæ cum reliquis omnibus de primatu certarēt, nisi tam fugacia noscerentur: vnde vernaculum nomen deductum est. Sunt mediocri magnitudine, turbinatiore figura, carne suauī, prætenera, &c. Petito ex Ruellij libro primo.

Ab his, in pretio sunt paradisiāna, de quibus
D.iiij.

paulo ante. Sunt autem ex paradisiānis quædam alia dulcia, callo corporis duriore, rotunda, quæ ob sui dulcedinem nimiam à palato morosiore laborantium fastidiuntur: quæ eadem esse putat Ruellius cum melimelis & musteis: Mustea enim (inquit) veteres appellarūt, ea quæ nos præcocia.

Alia sunt poma, quæ ab insitione pyromela vocari possunt: vulgus vocat, *pommepoires*: quòd ea in arbore pyro insita sint, habentque pomorum tantum formā, neque enim sunt turbinata æque ac pyra ipsa: saporem verò & ferè colorē pyrorū, præsertim eorū quæ calculosa vocantur, retinent.

Poma acida, vulg⁹ nostrū vocat malacria, *pōmes de malingre*, à saporis acrimonia: sūt oblongiora, dura carne, ex acerbo leniter acescente. Ruellius.

Poma sunt alia vulgo castinia appellata, *pōmes de chastignier*, austeriore gustu, dura veluti castaneg cartilagine, mediocri magnitudine, oblōga. Ruel.

Poma quæ vulgo francetura vocantur, *pommes de frācestu*, rotundū habent habitum & amplum, callum durius, gratam acerbitatem, quæ tandem in dulcedinem degenerat. ea diu seruari possunt, & annicula reperiuntur. Ruellius.

Poma purpurea Columellæ, ea sunt quæ nos vulgo rubelliana appellamus, *pommes de rouveau*: sanguineo enim sūt cortice, carne intus friabili, sapore non ingrato, & ex austero subdulci, nec cito fugientia.

Poma mirabilia vulg⁹ etiāmnū vocat, quæ Hierosolymitana Hetrusci: balsamina Ligures padani, & fruticē ipsū siue plantā ex qua prodeūt, appellauere, quòd ea poma oleo pri⁹ imbuta, & per

aliquot dies insolata, deinde vel fimo, vel terra tantisper obruta, dum intabuerint, balsami vires in glutinandis vulneribus adsciscere polliceantur. Cætera ex hortulo nostro, & Ruellij libro 2. desumito: nā potius hortēsis est planta, ex qua prodeunt, quàm quæ in seminario disponi soleat.

Mala insana, quæ Itali melensana appellant, Barbaro ea sunt, quæ nos vulgo vocamus, poma Cupidinis, siue amorū poma, *pommes d'amours*: de quibus vide hortulū nostrum: nam à frutice vulgari sunt in hortis conseri solito. Plura etiam petito ex Ruellij libro 2. cap. 124.

Plura hīc pomorū nomina describeremus, & nominatim persequeremur, nisi hoc superuacuū, & non omnibus vtile putaremus. Cum & pomorum nomenclationes ferè nationibus omnibus sint variæ: vnde fit, vt in tantis tamque varijs nominibus, atque etiam insitionum adulterijs (vt inquit Ruellius) perfacile quis falli possit.

Veniamus ad reliquas arbores, sub malorum generibus contentas: tum quòd fructus orbiculatos ferant, tum quòd simile quiddam cum pomis habeant: vnde etiam mali nomen retinent.

Arbores quæ SVB MALORVM GE- neribus continentur.

MALVS punica, *pomme de grenade*, dicta quòd apud Carthagenenses olim fuerit laudatissima, à
D. iiii.

quibus ad nos trāslata, & in Cyp̄o à Venere primū sata, vt testantur Græcorū fabulæ. Eius fructū hodie quidā malū granatū vocant, à granorū multitudine, quæ totidem esse numero in singulis pomis affirmant, etiam si magnitudo variet: modo ex eadem arbore legantur, inquit Barbarus. Quidā Græci ipsam arborē Rhoan & Rhoean, pomum quoque Rhoas, & Rhoidia, & Rhœdia vocare solent. Sidem porrò Hippocrati arbor ipsa dicitur à Bœotia regione, in qua frequens est, quæ etiam Sidem appellatur.

Mala punica dulcia, apyrena veteres dixere, *grenades douces*: dictio tamē Græca sonat, quib⁹ nulla est granorū durities, vel minor quā alijs. Nā acida granata, *grenades aigres*, acinos habent du-
ros, & quodammodo lapidosos: qui in sole siccati & obsonijs inspersi, inquit Dioscorides, fluētē aluum sistunt.

Cytinus Dioscoridi & Galeno, flos est ille puniceus mali granati, sed satiui: Balauſtium autē, syluestris, vulgò *des balustres*. Plinius verò pomū ipsum immaturum, & primum partum eius florere incipientis, Cytinum appellat: flores autem ipsos balauſtia, in ipso erumpentes cytino, vestibus tingendis idoneos, quarum color nomen inde accepit. Ex Barbaro.

Malicorium, mali punici putamen illud asperū dixerunt veteres, *lescorce dune grenade*: Græci sidiō appellant: nam arbor ipsa, vt prædiximus, à Bœotijs Sida vocabatur.

Cicum autem M. Varroni dicitur membranula prætenuis, in malo punico discrimen faciens.

Vnde Cicures animantes, quæ feræ non sunt, atque agrestes. A quo Veturij quoque nobiles, cognominati Cicurij.

Malus medica, à Media regione, quæ est inter sinum persicum, & mare Hircanum, vnde primū allata. Virgili⁹, Media fert tristes succos, tardūque saporem. Fœlicis mali, quo non præstantius ullum. Qua etiam ratione malus persica dicitur à Persia. Huius arboris fructus varij sunt, variique coloris & formæ: atque ob id nomina etiam diuersa sortita sunt. Quædam enim aurea appellantur, à colore propemodum aureo. Vnde Virg. Aurea mala decem misi, cras altera mittam. Atque ea quidem sunt rotundiora, & maiora, ac corticis durioris & crassioris: qualia fortassis sunt quæ Venetijs audij appellari poma Adami: vnde etiam fortassis nuptialia poma appellata, quòd edita sint à Tellure, vt fabulantur, nuntiato Iouis & Iunonis connubio. De quibus etiam puto fabulatos poetas, cum Herculem dixerunt ex hortis Hesperidum poma aurea rapuisse. Vnde ipsam arborem hesperida, & malum eius hesperinum vocāt, authore Iuba. Huius generis sunt & alia, minora tamen paulo: sed eiusdem prope coloris, quæ vulgò arantia appellamus: ab Arantio oppido, in quod primū ex insulis illis fortunatis aduecta sūt. Sed & medica ex ea arbore quā paulo ante retulimus, forma sunt & colore cōgeneri cū alijs: præterquā quòd non vsque adeo rotunda sunt, neque coloris tā speciosi ac flauī aut etiam aurei: sunt enim pallidiora. Quinetiam corticem dulciorem paulo habent ipsis arantijs: qua-

rum cortex nisi siccus, & saccaro cōditus, vix aut
 nunquam editur. Ea & citrea & citria mala La-
 tinis, hodie citronia appellantur, *des citrons*: vn-
 de citrinus color, & citreæ mensæ, apud antiquos:
 quas tamen Barbarus multis argumentis cōten-
 dit fieri non fuisse solitas ex hac citro arbore, aut
 medica siue persica, quæ exigua est, vt potius fru-
 ticeis quàm arboris nomē promereatur. apud Ita-
 los translaticia & triuialis, vt pluribus generibus
 citreta Liguriæ, Campaniæ, Benaco lacu, Italia
 ferè tota germinet foeliciter. Quin potius ait ar-
 borem, ex qua tam celebres mensæ ab antiquis, &
 Plinio ac Cicerone decantatæ fieri solebant, eam
 esse quam Strabo & Theophrastus, itē etiā Pli-
 nius tegetem, & thyan, & thyon appellauere:
 quæ ramis, caudice, frondibus, syluestri cupresso
 propemodum similis est. De hac videto Theo-
 phrastū lib. 4. & 5. cap. 5. Cæterum citrus nostras
 nihil commune cum cupresso habere videtur:
 cui folium est andrachnes vnedomisque, spinis
 intercurrētibus, vt in pyro & oxyacantha, sed læ-
 uibus, infestis mucrone & validis. Hæc Barbarus.
 Sed vt ad ipsa mala redeamus, certum est ex
 Athenæo mala citrea Plutarchi auorum memo-
 ria nunquam gustata fuisse: sed neque Plinij &
 Theophrasti seculis magnopere degustabantur,
 tantum odore commendato: nunc vero (inquit
 Hermolaus) à Palladij fere temporibus promi-
 scuū expetim⁹ cœnis: qui & medullas eorū acris
 dulcibus mutare docuit. Hæc itaque mala ex in-
 sitione quoties proueniunt, citromela proprie di-

cuntur ab aliquibus. Aristophanes autem grammaticus à Lacedæmonijs oxymala persica nūcupari prodidit, à sapore acetoso, & quòd ex Persia allata sint, quibus etiam deos coronari solitos suis temporibus refert. Dyphilus author est, citria quandoque pruna Persica vocari solita. Sed hæc ferè ex Hermolai commentarijs in Dioscoridem. Plura videto apud Ruellium libro primo De stirpium natura, quem nunc summa diligentia, & incredibili pene elegantia, in studiosorum gratiam imprimendum curat. Opus me hercule, omni laude dignissimum, & longe omnium præstantissimum.

Est præterea aliud malorum genus eiusdem cum citrio speciei, sed colorem ut plurimum viridiorem habens, & formam oblongiorē: minus tamen est pomum, neque tanti aut succi, aut odoris: quinetiam læuiori cortice præditum est, & in superiore, atque etiam inferiore sui parte veluti pappulas quasdam mammarum extuberantijs similes ostendens, longe eminentiores quàm malum citriū. Hoc itaque pomi genus vulgo Limonium appellant, nescio qua ratione: *ung limon.*

MALVS cydonia, *ung coigner*, à Sidonte Corinthi vico dicta, inquit Athenæus, cum cody mala prius vocaretur. Alij Cydoniam dictam putant, quoniam ex Creta primum allata fuerit, inquit Barbarus: nēpe à Cydone Cretæ oppido. Cotoneā primus Cato appellauit: fructus autem ipse vocatur, cydonium siue etiā cotoneū malum, *une pomme de coing*. Vltimum nomen adhuc Itali

retinuerunt, vt in hortulo satis diximus: vocant enim illi *melo codognio*. Atque hæc quidem mala cydonia siue cotonea, appellarim mascula, ad struthiorum differentiam, de quibus statim dicemus: sunt enim cotonea breuiora & rotundiora, & minus lanuginis habentia, rugis quibusdam distincta & coactiora: quorum succo fit optimum cydoniatum, *du codignac*: quod nostræ mulierculæ circa autumnum ita conficiunt: cortice primum adempto: deinde exēteratis ipsis malis, & ex aqua coctis, & per cribrum satis densum percolatis: postea cum melle & saccaro ad læuorem tritis. Si vero cōspicuum & pellucidum ac clarum, quod vocant, facere velint, id quidem cum albuminibus ouorum & cinnamomo inter percolādum faciūt, atque inde colorem aureū acquirit cydoniatum. Quinetiam Lugdunenses (quod fortassis ex Galeni documentis acceperunt) addito paululo scammonij in ipsa percolatione, cydoniatum laxatiuū (vt vocāt) facere consueuerūt, alioqui ex se astringere aluum, non autem soluere consuevit, præsertim si præsumatur. Hoc igitur cydoniatū cū scāmōnio factum, vulgus nostrum cydoniatum Lugdunense appellat, *du codignac de Lyon*. Sunt præterea malorum cydoniorum alia oblongiora, læuiora, & minus rugarum habentia, colore tã intus quàm exterius aureo, odorem non tam latè iactantia, maiori etiã humiditate abūdantia, quæ struthia mala, siue struthiomela appellantur: ego cydonia fœminina vocauerim cum vulgo, *des coignes*: quorum succo fit optimum medicamētum, quod diacydonion Galeno appellatur, ad prouo-

cādam appetentiā vētriculi. Columella lib. 5. cap. 10, tria malorum genera facit: struthia quæ serotino proventu odoratius vibrant: sub quibus Neapolitana cōprehenduntur (inquit Barbarus). quāquā Actio struthia dicantur, vt prius descripsim⁹, quæ magna sunt, vt suauiora, minorique placent acerbitate: præterea chrysomeliana siue chrysomela, quòd colore ad aurum sint inclinato: & muſtea, quæ præcocia sunt, & celeriter mitescunt. Vnde etiā melimela appellātur ab Atheniēſibus, hoc est, mellita & dulcia mala. atque ea quidem etiam miscella appellātur: fiūntque ex insitione, cū mali dulcis & communis surculus inseritur malo cydoniæ. Cæterum cotonea mala, struthijs insita, muluiana à re ipsa nominantur, quæ sola omnium vel cruda manduntur: cætera enim non nisi cruda vescendo sunt. Sunt præterea etiam cydonia syluestria parua, è struthijs odoratissima, in sepibus nata, quæ vulgus nostrum vocat, *coings sauuaiges*. Sed hæc de his satis. Plura videto apud Ruelliū in libris De stirpium natura.

Malus armeniaca, siue armenia, in persicorum genere apud Galenū venit. vocant autē Itali tā arborem ipsam, quā fructum, *diarmelini*: quemadmodum bolum armeniam, aut terram armeniacam dicimus, quæ primū ex Armenia Asiæ regione ad nos venit, & inde adfertur. Vulgus nostrum malum armeniam vocat, *ung abricottier*: & fructum ipsum, *ung abricot*, qui hoc solum, inquit Galenus, à persico discrepat, quòd minus malum sit. Columella lib. 5. cap. 10, Sorbi quoque (inquit) & armeniaci, atque persici nō minima est gratia.

Armeniaca autem, inquit Ruellius, prunorum generis esse tradunt, sola è prunis odore commendantur: atque hinc fortassis nomen nostrum deductum, quòd ea Græci non præcocia, sed bericoca nominent, vnde fit vt abricoca proferamus. Cuius opinioni facillime assenserim: vtrinque enim & foris, & etiam intus in ipso nucleo pruni potius quàm persici, naturam & faciem referre videntur.

Malus præcox, siue præcoqua videtur ea dici arbor Columellæ, vel quæ celerrime omnium fructum producit, (quales sunt illæ arbores, quas, vt prius dixi, vocamus vulgo, *hastives*): vel quæ mala præcoqua fert, de quib⁹ mox dicturi sumus. Ait enim ille libro 5. cap. 10, Locis, inquit, frigidis autumnii temporibus & aquosis, præcoques ponito: vt ante pluuiam fructum deligas. Itaque videto, quid præcoques arbores vocet. Mala autem præcoqua, è persicorum genere esse nemo dubitat: suntque ea persica, quæ vulgus nostrum appellat, *auant pesches*: quidam Trecacina persica vocant, *pesches de Troyes*: quod ex vrbe quadam Lutetiæ vicina (cui Trecis nomen est) ad nos adferantur. Ea vt cæteris sunt minora, ita iucundissimi sunt saporis, & gustus innocentissimi: dicta præcoqua, quòd prius nascantur, & celerius maturescant quàm alia persica: sola enim proueniendi celeritate à cæteris dissident. Vnde Martialis,

Vilia maternis fueramus præcoqua ramis,

Nunc in adoptiuis persica sola sumus.

Et quia in persicorum sermonem incidimus,

æquum est vt de ijs etiam nunc dicamus.

MALVS persica, vulgo notissima, dicta quòd è Persia siue Perside regione, ad nos primū venerit, indeque aduecta sit. Columella persicum arborem vocat libro 5. cap. 10, Siliquam Græcam, inquit, & persicum ante brumam serito. Arbor ipsa, tam nota est, vt descriptione non egeat. Pomum autem gerit carnosum, succulētum, extrinsecus lanuginosum, duram intus & scabram nucem habēs, quæ Latinis ossis nomine explicatur. Colum. Persici ossa, in pastinatis areis sunt ponenda, &c. Ita quoque & prunorum & cerasorum ossa vocabimus, quæ in ipsis continentur: non autem cum vulgo nucleum, *ung noyan*: nam nucleus est id quod ipsum os continet, quem falso amygdalum vocamus, à similitudine nuclei amygdalini.

Cæterum mali persici fructus multa sunt hodie apud nos genera, quemadmodum etiam apud antiquos fuerant. Est enim malum persicum popolare, quod nucleum dimittit: quorum persicorum optima omnium apud nos commendantur Corboliana, *pesches de Corbueil*. Omittā præcoqua & armeniaca, de quibus paulo ante. Sunt & persica duracina, ex re dicta, quòd corpus pertinaci⁹ hæreat ossi, quàm vt auelli queat, inquit Ruelli⁹: nos vulgo pressum vocamus, *une presse*: quòd caro ligno interiori apprimatur. colorem habent flauio-rem huiusmodi persica quàm alia: & vt plurimum crassiora sunt, & duriore carne prædita, vt non tam facile vnguem admittant.

Sunt & alterius generis persica, quæ ab insitio-

ne nomen acceperunt: vocanturque nuciperfica,
des *peschenoix*, quod in nucem iuglandem insertus
persicæ mali surculus, fructum ferat, inter iuglā-
dem & persicum communem. sed tamen colorem
externum tantum habere videtur iuglandis nu-
cis cortici similem: vnde fortassis sponte sua ar-
bor huiusmodi creuisse putanda est: est enim hu-
milis, præcoci persici proceritate, folio amygdalæ,
sed maiori, flore puniceo. Pomum emicat vi-
ride, carnosum, succulentum: sed cuius caro den-
tes obtūdat, præsertim si immatura sit: cæterum
nulla exterius lanugine pubescit: medio inter iu-
glandem & persicum malum sapore. scitent hac
arbore Galliarum plærque tractus.

Quinetiam ex insitione nouum persicorum
genus subortū est: vt ex amygdalo, seu nuce Græ-
ca, & persico aliud arboris & fructus genus ho-
die videamus, quod amygdalopersicum iure ap-
pellare possumus: malum enim ipsum foris per-
sicum mentitur, cuius etiam caro edi potest: intus
autem nucem habet, amygdalæ propemodum
similem, & facie, & nuclei gustu. Adeo nihil est
quod non quotidie hominum ingenijs nouum &
varium fiat. Sed iam æquum est, vt ad pyrorum
fructus & differentias veniamus, quando inter
mala connumerari licuit, & pomorum nomine
veniunt appellanda: quanquam è pyris sola quæ
libralia à pondere appellantur, mala dici con-
sueuerunt.

Pyrorum diffe-

RENTIAE ET FRUCTVS.

Prius quàm pyrū arborem explicemus, succurrit, vt, quandò adhuc sermo integer est de persica arbore, perseam etiam declaremus: ne quis vocū vicinitate deludatur, vt vnam pro alia vsurpet. Est enim perseæ arbor longe à persica dissimilis, quam pyro per omnia similem fecit Theophrastus. Pomū fert longius pyro, inclusum amygdalæ putamine & corio, colore herbido: cordis humani figuram referens, inquit Plutarchus: cuius etiam arboris folia linguæ humanæ formam habent. Perseæ dicta, quòd à Perseo Memphi sata fuerit. Apud nos nulla est, neque enim extra orientem nasci voluit. Plura ex Ruellio.

Pyrus arbor omnibus notissima, Græcis apios & adipios dicta, præsertim quæ vrba & edomita erat: vulgo *ung poirier*: cuius descriptionem & inferendi rationem, ex bonis authoribus collectā tibi dicet Ruellius noster, libro primo De natura stirpium. Nobis illud fuerit satis, iuuenibus nostris, bonarum literarum studiosis, in hoc satisficisse, vt vulgaria quæ sunt, & magis necessaria, explicemus. Pyrurū igitur arborum duo sunt genera: alia enim est satiuæ, quæ nomen suū retinet. Colum. Pyrū autumno ante brumā serito. Virg. -mutatamque insita mala Ferre pyrum. Alia est syluestris, quæ Græcis achras, Latiniis piraster dicitur, *poirier saulnaige*: Plinius syluaticam

E. j.

pyrum appellat: Si in pyrum syluaticam in seueris, inquit, pyrū quamuis bonā, &c. Fructus fert hæc arbor cū primis acerbos, & gustu astringentes, Græci achrades vocant, vulgus nostrū, *poires saunages*: quales passim in Rothomagēsi & Normano agro reperiuntur: ex quib⁹ succū exprimūt, & vinum faciūt, quod pyreā vocāt, *du peré*: quemadmodū ē pomis etiā solent, quod vulgo cidrea dicitur, *du cidre*: fit autē prælo, & trusatilibus molis, tortiuū ius exprimentibus. Deinde rursus (inquit Columella) secundariū vinū faciunt, fratribus & retrimētis aqua maceratis, ita vt pomea lora dici possit, nō parui ad restinguēdam rusticorum sitim momenti. Sed iam ad fructus veniendum.

Pyrorum genera, quemadmodum & malorum quoque tum apud nos, tum etiam apud antiquos sunt admodū multa, & quæ vix omnia recenseri possint, meo iudicio. Dabimus tamē operā, vt aliquot recenseamus, ne in hoc vobis defuisse videamur. Itaque ab antiquis pyrorū nominibus incipiemus: atque ea vobis proferem⁹, quæ ex Plinio, Columella, Barbaro, & alijs animaduertimus.

Pyra (inquit Plinius) à pomis hoc differunt tantum, quod vsque adeo orbiculata non sunt, neque perfectæ rotunditatis, sed turbinatis & oblongioris formæ ac figuræ: accipiuntque cognomina varia tū ab inuentoribus & personis quibusdam, tum à sapore & colore, tum etiam à prouincijs, vt mox dicturi sumus.

Pyra superba Plinio, parua erant, ocysima, odoratissimāq; , fortassis nostris moschetis similia.

Pyra crustumina eidem dicebantur ex parte

rubentia, omnium gratissimi saporis.

Pyra falerna, quæ & lactea dicta sunt, à potu, & succi abundantia.

Pyra Syria, à regione Syriæ dicta, colore erant nigro, quæ etiã Tarëtina Columellæ dicta sunt. Atque ita alia permulta à suis regionibus & locis, in quibus proueniebant vberius, cognomina accepere.

Authores suos nobilitauere (inquit Plinius) pyra Decumiana, à Decumio inuentore: vnde etiã pseudodecumiana appellata, quæ falsò Decumij nomen mentiebantur. Ita quoque & Dolabelliana, longissimi pediculi: Pomponiana, cognomine mammosa: & alia innumera ab authoribus, odore, tempore, colore, patrijs petita, quærito ex Plinij libro 15. cap. 15. longum enim esset omnia recensere.

Pyra ferotina, quæ ad hyemem vsque in matre pendent, gelu maturescētia, quæ & libralibus pyris natura est, *poires tardifues*. Cuius generis sunt, quæ etiam laurea appellantur.

Pyra volema à Virgilio dicta, quòd volam implēt: vnde inuolare dicimus, inquit Seruius. Eadē sementina & mustea vocauit Cato. Volemia appellat Macrobi⁹ lib. 3. ca. 19. Satur. Quo in loco, cirita, ceruifca, calculosa, lolliana, & permulta alia pyrorum cognomina legito. Nunc ad nostra vulgaria veniendum: quorum cum permulta iam adnotassemus, & in puerorū gratiam descripsissemus: factum est vt eādē operā præstitisse, & ferè eodem tēpore nostrū Ruelliū animaduertirim: cuius librū cū nondū adhuc omnino impressum

E.ij.

legissem, & in hanc partem incidissem, quæ de re nostra diligentissime tractat: malui viro doctissimo, & in huiusce rei cognitione longè absolutissimo cedere, quàm mihi id attribuere, quod ille accuratiori inuestigatione multò ante me præiudicabat. Itaque vulgarium cognominum interpretationē ex eo desumemus: quibus fortassis nōnulla quædā à nobis præterea inuenta subnectemus.

P Y R A itaque omniū nobis gratissima sūt, quæ vulgo bōchrestiana cognominantur, *poires de bon chrestien*: non ob hoc solum quòd in eximia suauitate libræ pondus æquent: sed quia tantæ sunt teneritudinis, vt gustata vel ipso ore & tantum primoribus labris, statim eliquescant, & perennent, gestatūque tolerant. Primū quidem Neapolim vsque delata Carolo octauo ibi res gerente, à fœlici illa Campania.

Proxima magnitudine sunt ijs mariana, vulgo diuæ Mariæ pyra dicta, *poires de nostre dame*: aquosa dulcedine suauia, miræque teneritudine placēt: sed fugaciora multo, quàm bonchrestiana.

Minima omniū sunt muschata, *poires musquettes*: quæ nomine alio chia vulgo dicūtur, *poires de chiot*, baccas corporis tuberculo non excedentia: quina senāve, sape plura ab vna origine longis dependent pediculis: odorata moschi iucunditate: ab hoc nomen contraxerunt.

Media magnitudine sunt callionia, *poires de calliot*: quæ eadem calculosa dici posse, & eleganter quidem, nos docuit Iacobus Syluius: quod exēterata, veluti calculorum quorundam multitudinem ostendant, qui etiam inter edendum sentiū-

tur. carne sunt iucunda, dulci, odorata, friabili. à præstâtia pyri (inquit Ruellius) Græcum nomen vulgus emendicauit, quasi dixeris meliora.

Pyra rosata, à sapore & odore dicta, quòd dum eduntur, rosas oleant. Idque fieri quidam putât, si dum inseritur furculus, aqua rosacea humectatur: aut dum planta & semen in seminario ponitur, aqua rosacea irrigatur.

Pyra bicipitia, quòd gemino capite visantur, *poires à deux testes*: singulari sunt commendatione, corpore suavi, non lapidoso, succi grati, palatum etiam morosum recreantis.

Turbinatiora omnium certoliana, *poires de cer-teau*: quæ Campanica alio nomine dicuntur, non quidem ab illa Campania, quæ in Italia est: nam apud Italos sunt peregrina: sed à nostra Galliarû Campania, quæ Pertosienfis appellatur. Ea igitur pyra in metæ formam mucronâtur, hyemē tolerant, duriore corporis callo, mira suauitate, præsertim cocta iter cineres, & prunis tosta, ita enim saccharata videntur. Nōnulli, vt saporem augeant, saccaro condiunt, adiecta cinnamomi & caryophyllorum portiuncula, vt cœnas claudant.

Pyra Martiniana, *poires de saint Martin*, quòd ad hyemem vsque durant, & in parente propendunt: colligunturque circa Martinalia, aut D. Martini festum, suavi sunt gustu, firmisscula carne: quæ non nisi cocta ferè manduntur. Vbi gelicidia sensere, sunt multo teneriora: ea etiam hybernas mensas finiunt.

Finora vulgo appellata, *poires de fin or*, quòd auri puti colorem referant. asperiores sunt carne,
E. iij.

duriorēque prædita: non prius quàm gelu experiantur, edomita duritie mirescunt. Ea diutissime durant: quamvis in eo genere æstiva inveniuntur & præcocia.

Quæ autem eius generis præcocia inveniuntur, ea vulgus nostrum vocat, *poires de hastineau*: quòd celerius emergant & prodeant, quàm alia.

Magnopere commendantur bergamota, *poires bergamotes*, seri nostra memoria cœpta, & sapore & succo præstantia.

Sunt & quæ strangulanea pyra appellantur, vulgo *poires destranguillon*: quæ cum pulchritudine & rubro colore & luteo, quasi maturitatis indice prætereuntes inuitent ad carptum: mansa tamen tanta displicent acerbitate, vt deuorari nequeant: sed demorsa, protinus respuantur, vnde nomen habent.

Proxima his ferè sunt quæ angustiana, siue angustia pyra nominantur, vulgo *poires dangoisse*: quòd dum eduntur: acerbò & austero quodam sapore ita molesta sunt, vt angustiores fauces reddant, & plurimum noceant, nisi matura admodum & emollitissima carpantur.

Pyra item tofacea, *poires de tuffé*, dicta quòd intus scabra sint, & veluti tofos quosdam sentiamus, dum illa edimus: minus sunt turbinata, cærei coloris & aquosi, ac multi succi, præsertim dum maturuerunt. Atque hæc sufficiant de pyrorum generib⁹, quæ qui omnia (vt sunt innumera) referre vellet: vix integrum volumen huic operæ satisfaceret. Reliqua quisque apud se colligat & consingat. Nunc ad prunorum differentias.

Prunorū ordo.

Absolutis iam Pomarij nostri duobus ordinibus, tertius nunc nobis est instituendus : in quo prunorum differentias & genera breui ratione describere nos oportet.

Prunus, *ung prunier*, à Græcis coccomelea vel coccimelea dicta: arbor est procera, radicibus summo cespite vagantibus, paucis, &c. Videto diligenter Pliniū lib. 15. cap. 13. & Theophrastum lib. 3. cap. 16. Duplex autem est prunus arbor: alia enim est domestica, siue urbana & satiuā, atque edomita, de qua nunc agitur. Alia agrestis & sylvestris, quam spinum vocasse videtur Virgilius eo versu, Spinos iā pruna ferentes. Pruni sylvestres, genera spinarū sunt Columellæ, quas Theophrastus contumacis vitæ tradidit. Sed iam ad fructus ipsos, vt breuiter agamus.

Fructus prunorum sylvestriū, Græci epymelidas vocant, nos vulgo *des prunelles*, tracta dictione à Græcis, qui fortasse, vt inquit Galenus, prunum agrestē in Asia prumnū vocāt: vulgus nostrū vocat, *ung prunellier*. Ceterū prunorū sylvestriū succo hodie fit optima acacia apud pharmacopolas.

Prunorum domesticorum ingens turba, inquit Plinius, versicolor, nigra, candicans, &c.

Hordearia pruna, antiquis dicta, à comitatu eius frugis: sūntque ea quæ cærea vocamus.

Asinina pruna, eodem colore, sed seriora & maiora: à vilitate cognominata: quemadmo-

E. iij.

dum nos etiam quædā pruna eiusdem propè speciei vocamus, vulgo *des poitrtons*, ou *des dauesnes*.

Sunt & pruna armeniaca, inquit Plinius, ab externa gente cognominata, atque hæc quidē solo odore commendantur: vulgo nos apricota vocamus, *des apricotz*: de quibus suprà in persicis.

Inseriebātur etiamnum Plinij temporibus pruna ipsi nuci iuglandi: atque hæc quidem quæ ex tali insitione prodibant, nucipruna appellabantur, quæ faciem parētis, & succum adoptionis exhibent. Quinetiam eiusdem Plinij memoria, in Bethica regione, malis pruna inseri cœperant, atque amygdalis: quæ ob id malina & amygdalina vocabantur.

Pruna onychina Columellæ dicebantur, quæ & cerina: hæc vero onychis, id est vnguis formam habebant, vnde cognomen acceperunt.

Pruna damascena, *prunes de damaz*: à Syriæ Damasco cognominata, inquit Plinius: à peregrinis arboribus nomen acceperunt: nunc etiam apud nos familiaria: sūntque nigra cute, carne suavi, rotundo ligno, exili nucleo: quæ digitis pressa internum os dimittunt.

Sunt autem alia eiusdem speciei, cute quidem nigra, & quodāmodo lanuginosa (si quidem mucus aut flos ille lanugo appellari debeat) sed carne subacriore, & minus solida, quæque digitis pressa internum os non dimittunt. Ea autem vulgus nostrum appellat, *prunes de Ioras*.

Popularia Damascenorū pruna, sorbis Romæ inseri solita, Plinius à Græcis mixa appellari cōtendit: Quibus, inquit, similis est persicus AEgy-

ptia: nisi quòd poma AEgyptiæ rubescunt. Paulus myxón arboris esse fructum meminit, minorem pruno, & consimilis facultatis. Atqui Ruellij opinio hæc est, vt quæ Græcis myxa, & per diminutionem myxaria nunc officinis dicuntur, Galenus serica appellauerit (quanquam serica ad nostras iuiubas retulerim) quæ inutilia stomacho, nec nisi fastidiosis pueris, aut malacia laborantibus mulierculis expetita. Syrii Augusti, vt conijcio, honore sebastos hæc myxa vocauerunt: nunc, vt interpretor, officinæ sebesten. Arboris eius ligno cortex albus, ramus virens, folio rotundo, amplo, fructus in racemo dulcis, candido lentore plenus, cū interiori nucleo quasi oliuæ siccatur. Haftenus Ruellius. Idē tamē alio loco, ordine alphabetico de myxa loquēs, ait esse arborem ex eorū conspectu quibus frequēs est, procero caudice supra terram elatam, qui cortice candido vestiatur. Fundit ramos (inquit) viridi colore nitentes, folia habet in rotundū circinnata, poma auellanæ nucis magnitudine, racematim collecta, per maturitatem cærulea, callo corporis dulci, intus albo, mucoso lentore: vnde Græcis nomen vsurpatum putaue- rim, qui myxon mucum nominare consueuerunt. Viscum fit in Syria ex arboris huius acinis, quod damascenum vocant, commēdatissimū aucupijs, præterquam aquatiliū volucrum. *de la gluz.*

Est & sua prunus, vt Theophrasto placet, AEgypto, magnitudine insigni, non dissimilis spinæ Syriæ, folio pruni, sed immortalis, pomo mespili, ligno intus grandi & rotundo. florere incipit mēse Iulio, maturescit bruma, nec folia dimittit. Cor-

pus ipsum pomi natura copiâque messium instar incolis: purgatum enim tundunt, seruântque eius offas qui Thebis habitant. Hæc Barbarus ex Theophrasto.

Cæterum hoc etiam sciendum est ex eodẽ Barbaro, in syluestribus satiuísque prunis, limum esse arborum, quem Græci lichena vocant.

Pruna Iberica (inquit Aetius) dicta, quod primum in Hispania venerût: sũntque omnium dulcissimi succi, duriorísque carnis, gustu suauis. Ea, quâ parte solem spectant, purpureo nitent colore, aduersa parte candicant, vel subrubẽt: & pressa digitis internum os dimittunt, quemadmodum damascena: Ruellius pertigona cognomine appellata fuisse scripsit.

Alia sunt coloris cæræ, ex candido in luteũ pallescentia, quæ cæreola vel cæreola apud nos etiam vocitantur, inquit Ruellius. *prunes blanches*.

Alia maiuscula, mollia, purpurea, pedicularia vulgo à vilitate dicta: quibus sues rure saginantur: quæ non ab re asinina appellari possint. Ruellius. De purpureis autẽ sic Columella lib. 12. cap. 10: Pruna (inquit) purpurea cum immatura, non tamen percruda legeris, diligenter inspicio, vt sint integra sine vitio, aut vermiculo.

Commendantur etiam summopere apud nos, quæ prunidactyla vulgo appellâtur, *prunes dattes*: fortassis non ijs omnino dissimilia, quæ Columella onychina appellauit à forma vnguis: nam & hæc quoque à dactyli, hoc est fructus palmæ arboris figura, nomen retinuerunt. Ruellius tamen à longitudine digiti appellari putat. sunt autem

purpurea, suavi carne, orata pomi specie, insitionis mangonio, nusquam non nascentia.

Alia sunt, inquit Ruellius, quæ noberdiana & iuliana appellatur: aliquanto seriora, cæruleo colore, cumulatim in parente intorto furculo pendentia, dum passa contrahantur in rugas.

Cætera prunorum vulgarium genera persequi ut longissimum esset, ita sane laboris prope infirmi. Quapropter unusquisque apud se quæ supersunt, inquirat: & vulgarem cognominationem sequutus, ijs nomina imponat: atque ea forma describat, quam in superioribus posuimus. Nunc ad cerasiorum ordines veniendum.

Cerasetum.

Cerasetum id appellare possumus, quod vulgo dicitur, *une cerisaye*: ea forma qua castanetum & oliuetum, de quibus postea. Itaque cerasetum locus erit cerasis arboribus, amœnitatis vel etiam vtilitatis gratia consitus.

Cerasus autem arbor est vulgo nota, *ung cerisier*. cuius descriptionem ex Plinio lib. 15. cap. 25. & lib. 23. cap. 7. & 16. cap. 18. sumito: vel ex Theophrasti lib. 3. cap. 13. nam vulgarium arborum descriptiones pueris referre longissimum esset, Id tantum sit satis ex Athenæo & Plinio scire. Lucullum Romanorum Imperatorem, posteaquã debellato Mithridate, victoria potitus esset, primũ arborem hanc à Cerasunte Pontico municipio

in Italiam detulisse: fructumque eius gentilitio nomine cerasiū appellasse. Etenim pomum ipsum non cerasum, sed cerasium vocari Seruius præcipit: quod sanè crediderim elegantius esse, & magis proprium. An verò eidem credendū, qui cornū in Italia cerasiū fuisse prodat, cum alia res omnino sit cornus, alia cerasus, satis ambigimus. Sed de cornis postea: nūc ad cerasiorū varia genera.

Cerasiorū genera, quæ Plinius retulit, ferè sunt hæc, ut primū ab antiquis vocabulis incipiamus.

Aproniana, quæ maxime rubent. Nigerrima sunt actia. Rotunda verò cæciliana. Iulianis gratus sapor, sed pene tantū sub arbore sua adeò teneris, ut gestatum nō tolerant. Principatus duracinis, quæ Campania Pliniana nominat: in Belgica Lusitanis: in ripis etiam Rheni. Tertius ijs colos è nigro ac rubenti viridique, similis maturiscentibus semper.

Sunt & laurea cerasia, in lauro primū insita, quæ minus quinquennio, antequam Plinius commentaretur, prodierant, nō ingrata amaritudinis: atque hinc amarasia vulgo apud Italos appellata, inquit Barbarus, quasi amara cerasia: quod amarorem non iniucundum resipiant.

Sunt & Macedonica cerasia, parvæ quidem arboris, raroque (inquit Plinius) tria cubita excedentis: & minore etiamnum frutice chamæcerasi. Inter prima hoc è pomis colono annuam gratiam refert. Primum candidum, mox rubescit, deinde fugiens nigret. Hæc ex Plinio.

CERASIORVM autem apud nos varia etiam sunt genera: quæ optimum est ut explicemus.

Quædā (inquit Ruellius) mediocri arbore cre-
scūt, interdū pumila, quasi frutice (quam chamæ-
cerasum dici putat, hoc est, cerasum agrestem).
pendent autem pediculo breui, pomo rotūdo, ru-
bēte, carne multa, molli, succosa, osse intus duro,
nucleo dulci, grato acore placentia: fortassis ijs si-
milis, quæ aproniana Plinius appellauit: atque
hæc quidem apud nos tantū cerasij nomen me-
ruerunt: vulgus enim vocat, *des cerises*: etsi in Lu-
gdunensi agro cerasia appellent, quæ Franci gui-
nea: & ediuerso guinea, quæ illi cerasia: sed hoc
linguæ varietas, & incerta quædam, atque incon-
stans vulgi opinio effecit.

Chamæcerasus autem arbor, & chamæcerasia
forte appellanda erunt, quæ in syluis & nemo-
ribus, nonnunquam in dumetis & cultis inueniū-
tur: baccis paruis, callo carnis rotundiore, ossibus
oppresso, parte soli obuersa rubescente, auersa cā-
dicante: sapore dulci quidem, sed dilutiore ruri
familiaria: sponte, nullo humano cultu, nascētia.

Sunt & insuper alia nigerrima, quibus succus
inest sanguineus, vt vescentium manus & labra
sanguine suo, modo mororum, inficiant: vtra-
que autem (inquit Ruellius) sessiana rura vocant.
sed posterius hoc veteribus ætianum dici pu-
tauerim, vt prius illud forsitan cæcilianum: cur-
tato (vt in Gallia plærunque fieri solet) vetere vo-
cabulo, cessianum pro cæciliano concise prola-
tum. Hæc Ruellius.

Sunt & quædam cerasia (inquit idem) quæ po-
mo prodeunt proximo ex arbore, grandiuscula,
longiore petiolo, gustu multò acidiorē quàm su-

periora, & subacerbo, cætera apronianis similia: hæc autē vulgus merasia vocat, *des merises*. Quorum quædam ob nimiam sui acrimoniam respiciuntur: quædam nimia sui dulcedine fastidium pariunt. Multò sunt minora alijs: & quæ acida, rubicundum colorem præ se ferunt: quæ vero dulcia, etiam nigerrimum: vt manus & os ipsum ac labra, haud secus ac mora intingant.

Alia cerasia procera ex arbore dependent: turbinatiore & oblongiore pomi figura: pediculis longis, pluribus vnà coeuntibus: baccis partim rubentibus, partim candicantibus, nonnunquam in totum rubris: prædulci carne, ori iucunda, fragili intus osse, nucleo nō insuavi. Sed hoc malum longè acidis fugacius, primùmque (inquit Ruelius) in cerasiorum genere maturitatem sentit, vulgus nostrū guinea vocat, *des guynnes*, fortassis ob id, vt quidam autumāt, quòd ex ea parte Galliæ primum allata, quæ Aquitania dicitur, vulgo *Guyenne*, vnde nomen tractum.

Sed inter ea habentur quædā crassiora, alta carne, prædura, magna ex parte albicantia, prædulci gustu, callo corporis nucleo pertinacius hærente: vnde putarim veterib⁹ duracina cerasia nūcupari.

Sunt præterea etiam alia ijs congenerem quandam formam habentia: sed tardissime omnium crescentia, crassioraque & nigriora: carne duriore & solidiore, admodum dulci, & in qua per maturitatem vermiculi albicantes generantur: omnium enim facillime putrescunt. Ea cerasia vulgo cordia appellantur, *des cœurs*, à cordis humani effigie, quam tum ipse fructus, tum etiam os ipsum,

quod intus continetur, præ se ferunt. Quidam à galeri cuiusdam forma vocant, *des heaulmes*, *des cerises heaulmees* : & arborem ipsam, *ung heaulmier*. Quæ nomina in agro Andegauensi peculiariora sūt.

Cætera cerasiorum quæ in totum rubent, molitia alijs cedunt: quæ partim albicant, partim rubescunt, cum vtrisque societatem ineunt. Celerius marcescunt, quæ molliori constant carne.

Condiendorum autem & conseruandorum cerasiorum rationē hoc loco explicare supervacuū videretur: quandò & id omnibus notum est, & institutum nostrum excedit: quemadmodum etiam si conserendarum arborum formam præscriberemus. Quæ omnia fusissime doctissimus ille Ruellius pertractauit. Nunc ad cornos arbores.

Sed prius quàm de cornis dicamus, ne quis affinitate & consonantia dictionum decipiatur, vt ceratia pro cerasijs dicat : æquum videtur id quicquid est dubij soluere, & hoc loco de ceratijs dicere, quas siliquas Latini vocant.

CERATIA igitur (inquit Galenus lib. 2. De alimentis) per t litteram scripta, atque prolata tertia syllaba, nihil cum cerasijs per s scriptis habet similitudinis. Lignosus nanque est hic fructus, & in cibo prauis succi, necessariò etiam cōcoctu difficilis. Hæc ille.

Idem lib. 7. Simplicium, arborem huiuscemodi siliquas ferentem, ceratoniam vocauit: Ceratonia (inquit) exiccantis est & astringentis facultatis, sicut & fructus eius quæ ceratia vocant: nonnihil etiam dulcedinis continens. Accidit autem istis quiddam simile cerasijs, &c.

Columella siliquam Græcam appellauit ipsius arboris fructum, quem etiam à Græcis ceration vocari tradit: Siliquam Græcā (inquit ille lib. 5. cap. 10.) quam quidam ceration vocant, & persicum, ante brumam per antumnum serito.

Ceration autem vocarunt Græci fructum, à corni similitudine. Recētiore Græci xylocerata vocant, inquit Barbarus. Quidam etiam Latini siliquas dulces: Itali vulgo, *delle carebó*. Siliquam etiānum arborem ipsam, vel siliquam Græcam Latini appellarunt, vt in priore Columellæ exemplo visum est, propter nobilem siliquarum fertilitatē.

Arbor hæc in Italia, & apud nostros Vascones frequens, siliquas ferens digitorū hominis longitudine, sed latiores, falcatas, pollicari latitudine: quæ lignosæ cum sint, eduntur tamen, & prædulces sentiuntur. Succo & semine cassiam fistulam referunt. Quælibet siliqua quatuor intus grana continet, quæ neque caro, neque lignū, neque cartilago dici possunt: atque hæc quidem etiam ceratia appellantur.

S E D est & alia siliqua arbor, quam Iones ceroniam appellant, ne quis decipiatur, quando ferè accedit ad ceratoniam: sed longe alia est, & à siliqua Græca omnino diuersa: quam Theophrastus describit, in Syria, Ionia, & circa Gnidū Rhodūque nasci: trūco fertilem, siliquæ pomo, folijs semper comantibus, flore candido cum odoris vehementia, &c. Fructum anniculum simul & nouum continet: pomo antecedentis anni circa canis ortum detractō, statim alterum concipit. Cætera ex Barbaro & Ruellio desumito. Mihi

satis fuisse puto, quòd admonuerim lectorem eius
rei, ne quid etiam desyderare possit.

Cornorū ordo.

Cornus arbor, crania vel cranias Theophrasto & Galeno appellatur: vulgo autem, *ung cornouillier*. dicta fortassis quòd caudice sit ita solido & nodoso, vt cornibus spissitate nō absimilis respōdeat. Sexus in ea duplex. Est enim cornus fœmina, quæ Theophrasto thelicrania, quasi fœminicornus dicitur: caudice fungoso & inutili, virgulis instar amerinæ fruticat, autumnalibus baccis perquam acerbis: quæ difficillime mandūtur, dumetis & nemoribus familiaris: sed (inquit Ruelius) quòd neglectas & ingustabiles ferat baccas, indignam quæ corni nomine vocaretur, rura putauerunt. Corno mascula (inquit Plinius) materies robusta, solida, excorsque tota est: hoc est, sine medulla, & cornu instar prædensa & ossea (vnde optima venabula fieri videmus) duodecim ferè cubita excedit, folio amygdalæ, sed crassiori pinguiorque flore, & fructu oleæ, dulci, grato odoratu: pluribus cornis singulari pediculo dependentibus. In Ida sterilis: tamen apud nos multo feracior & fructuosior, præsertim si vrbana est corn⁹ mascula, quam vulgus nostrum corneliā, vt prius diximus, appellauit: nā fœmina fruticosior est, & serotinos fructus fert, nempe post autumnum: præcox autem cornus mascula, circa æstiuā solstitia fructū reddit, primò cādidum, postea sangui-

F. j.

neum: Dioscoridi, oliuæ similem, oblongum: per initia viridem: cū ematuruit, rufum: cæræ æmulum, cibis idoneum. de quo mox dicemus.

Est & in India arbor (inquit Plinius) ferens fructus cornis similes, quæ merito cornus Indica nominari potest. Sed nunc ad fructus.

Corna, appellantur corni arboris fructus: vulgus nostrum cornelia vocat, *des corneilles*: os intus lapidosum continent. Vnde est illud Virgilij, Lapidosa rubescere corna. Cæterum quo pacto condiantur, & cuius sint saporis, qui volet exactius scire, legat Ruellium. mihi tantum suffecerit hæc paucula pueris nostris prælibasse: nā cornorū, aut fructuum, aut arborū alias differentias non reperi. Nunc ad sorba & mespila.

Sorborū & mespilorum ORDO.

Ambas has species fere cōgeneres duob⁹ quincūcialib⁹ ordinib⁹, vno interordinio discretis, in nostro pomario cōseremus, ac vicinas faciemus.

Sorbus, arbor est procera, quam Græci oen & œien, fructūque oa & va vocant: Galli, *ung cormier*: cuius descriptionem longissimam videbis apud Theophrastum lib. 3. cap. 12. & Plinium lib. 15. cap. 21. Est autem duplex, mas & fœmina: sed fœmina sola fructificat, fertque à trimatu. Autumno folijs subinde amissis cachrin suam fundit, eduraturam hyeme vt in robore. Plura

petito apud Ruellium: nam hæc tātum puto esse magis necessaria.

Sorbi fructum, Columella mala sorba appellat lib. 5. cap. 10. Vulgus nostrum, *des cormes*. Hoc autem inter se discrepare videtur ipsi fructus: quod alij sunt figura orbis, alij oui similitudinem habent. Discrimē item est eorum in succo: alij enim odoratiores dulcioresque sunt, vt orbiculati fere omnes: alij acidiores, peiūsque olentes sentiuntur, vt ouales. Sed sorbo syluaticæ, inquit Theophrastus, præstātor semper est quā vrbana, fructus. Sorborum alia genera & differentias, item condituræ rationem ex Hermolai corollarijs, & Ruellij libro primo desumito. Nunc ad mespila.

MESPILVS arbor spinosa, malī vulgaris altitudine inferior, folio acutæ spinæ, &c. quæ ex Theophrasto requires. Gallorum quidam meslierum, quidam nesslerū vocant. *ung meslier*, ou *ung nessler*. Itali priore litera tantum immutata pro mespilo nespilum dicunt. Cæterū hæc arbor Catonis æuo in Italia non fuisse comperitur.

Theophrastus & Plinius locis superiorib⁹ tria mespilorum genera commemorant, anthedonā, setamam, gallicam, quam degenerare tradit Plinius. Quarum descriptionem apud ipsos auctores videbis. Dioscorides duobus tantum generibus contentus est, altero quod mespilum appellat, & à quibusdam aroniam vocatam tradit, cui folia acutæ spinæ tribuit: altero quod aliqui setaniū, aliqui epimelida vocāt: Hippocrates autē hoc amamelida vocauit. Sed de epimelide varia aucthorū sentētia. Tertiū autē id genus, quod Theo-

F. ij.

phrastus & Plinius cōnumerarunt, incertū est an cum sorbo connumerarint ac confuderint: quandoquidē inter altissimas ponūt gallicā illā mēspilum: quōd certe sorbo quā mēspilo nūc vocatæ magis cōuenit, nisi quis (inquit Ruelli⁹) nostratē mēspilū chamæmēspilum appellandam fortasse censeat. Galenus mēspilum cōmuni vocabulo tricoccum, quasi triossum, aut triganium ab aliquibus appellatum meminit: quoniam tria intus grana, siue ossa, seminis loco fructus contineat. Quid autem sit epimelis Galeno, in arbuto prius descripsimus.

Galli nostri (authore Ruellio) duo tantum obseruant mēspilorum genera: vnum quōd rarioribus horret spinis, in dumetis & nemorib⁹, neque non viuīs sepibus, quasi syluestre nascens: pomo paruo & per initia tam acerbo, vt vix edendo sit, prius quā per hyemis frigora mollescat. vocant autem id pomum, *une nēfle*. Alterum grandiore pomo, ita vt mala reliqua magnitudine peræquet sine spinis: quod videtur crebro insitu in hortis cōmituisse, & feritatē cultu deposuisse. Poma per gelicidia acerbitate domita in passo vel mulso coquantur, adiecta cinnamomi portiūcula, vt sint cibo gratiora. Hæc ex Ruellio. Neque plura de hac re, ne prolixiores videamur quā par sit, in re satis facili & explicata. Veniendū est ad Oliuetum, vt vno contextu, fructus omnes ossibus intus munitos describamus. Posthæc autem ad ficetum, & nuces, ac castaneas descēdendum erit.

Oliuetū, quod ET OLETVM CATO- ni dictum est.

Relinquēda sane erat bona pars Seminarij nostri, in qua oliuetum deponeremus & confereremus. Quapropter etiā multi ordines ad olearum consitionem relictī, & vtilitatis gratia ipsis oleis destinati, nunc declarabuntur.

Oliuetum tantum Gallia Narbonensis nouit: in reliquis enim Galliarum partibus minus frequēs est aut fœlix olearū prouētus, qui apud Italos fœlicissimus semper fuit: vt etiā ipsis vitibus oleas maritare solerent: atque hinc oliuas decerpere: quæ medijs essent inter vinū & oleū saporis. Plurima oliueta visuntur hodie circa Padum & lacū Lemani: item circa illud Tibur quondam nobile Romæ vicinū, vnde vestitum olea Tiburnū montem dixit Virgilius lib. 2. Georg. Quorū oliuetorum cura, & conferendi ratio haud est ipsis Italis minori in pretio quā olim fuit: tantāque adhibēt in oliuetorum cultura diligentiam, quātam in nostris vinetis adhibere solem⁹. Itaque quandō id nobis non est vsque adeo frequens, cum tamen oleo quotidie victitemus: commodū videtur primū de oleis: deinde verò de ipsis oliuarum generibus: posthæc autē de ipso oleo pertractare: & pueris nostris hac in re dare operā, vt saltē ipsum Columellā, & alios authores La-

F. iij.

tinios facilius intelligere possint. Nam (vt iam sæpe diximus) non est id instituti nostri, agriculturæ rationem, & cætera id genus, percurrere: id enim maiori diligentia, & multò accuratiori dicēdi ratione collegit noster Ruellius (vir omnium, sic enim loquar, qui hodie huic rei dant operam, lōge peritissimus) quàm à quoquam dici possit. Nos verò tantum faciliora attingemus, & quæ scimus pueris nostris maximè esse vtilia, ad bonorum authorum cognitionem: relictis ijs quæ altiora erunt, & ab ipsius Ruellij fonte petenda. Sed ad nostram oleam.

Olea, Græcis elæa, Latinis interdū termes, Gallicis oliuerus, *ung oliuier*: arbor est notior, quàm vt explicari debeat. est enim saligneis fere frondibus, vt eminus oliuetum si spectes, haud prius tibi cognitum (quod mihi aliquando accidit Italiā peragranti) facile pro salicto accipias, & salictum sine controuersia iudices: nisi cominus inspicias oleæ frondes esse angustiores. quæ tam breui innituntur pediculo, vt quasi defixæ cohæreant: flores præterea gerit olea pusillos, sed foliatos, fructum ambientes: qui cadiui, si perforati spectentur, probè flosculorum iacturæ præbēt auguriū. Reliqua inuenies apud Plinium.

Oleam Mineræ sacram, Græci moriam vocabāt, inquit Aristophanes & Pollux: quēadmodū in Olympia nascentem oleastrum, calistephanon appellabāt, quia Olympiæ victores ea coronarētur, vt inquit Pausanias. Fructiferam verò oleam poetæ Græci secon appellarunt Phocioni.

Oleaster, Græcis cotinos dicitur, siue agrielæa,

hoc est syluestris olea, fœcundior satiuā: quod ferè syluestres habent, ceu cura fertilitatem minuente. Virg. Indicio est tractu surgens oleaster eodem Plurimus. Cætera quæ ad culturam & descriptionem pertinent, ex longa authorum disceptatione inuenies.

Oleā Aethiopicā (inquit Dioscorides) veteres Græci oleastrum appellarunt, atque id ex similitudine: est enim arbor in ea regione oleastro similis: itaque nullum inuenit ob similitudinem aptius, cui compararetur nomen & genus. Olea autē hæc (inquit Barbarus) in Arabia nascitur in maritimis & fluctibus, æstūq; operitur rubro mari, à qua destillat lachryma quædam, scamnoneo aliquantulū similis, rufuscula tamen (inquit Ruellius) stillicidijs minutis mammosa, mordaci gustu, gummi aspectu, & ammoniaci similitudine nigricans. ex qua hodie fit medicamentū ad multa vtile. Sunt qui putēt id esse quod vulgo in officinis gummi Arabicum appellatur.

Sed ne quis dictionum affinitate decipiatur, ut quo loco oleagnum inueniat, oleaginum legendū putet: quemadmodum baccam & radicem oleaginā Cato appellat, quæ ex olea arbore decerpitur. Sciendum est oleagnon siue elæagnon Theophrasto fruticem esse aquatilem, falicis amerinæ folio, sed molli, lanuginoso, flore populi albæ, verū minore, fructu nullo. Nascitur plurima super insulas fluitantes. Dicta fortassis elæagnos, quasi olea casta, quod nullos fert fructus, vel quia fructi huic fere similis est, qui agnos à Græcis, hoc est castus, à Latinis vitex dicitur. Pharmacopolæ

F. iij.

corrupte agnumcastum vno verbo nominant. Videtur enim esse viticis quædam species, inquit Ruellius.

OLEAE fructus, oliua appellatur: Gallis, *une olive*: quanquam interdum apud authores licentia quadam confundantur: vt oleam conditaneam apud Varronem legas, pro conditiua oliua, & quæ facile condiri aut recondi & asseruari possit in amphoram, & spissamentis impositis ad vsus in cellam reponi. Item oliuæ ramum, pro ipsius oleæ ramo apud Virgilium inuenies: sed tamen frequentior & vsitatissimus modus est, vt oleam pro arbore, oliuam pro fructu ponamus.

Oliuarum genera apud antiquos decem potissimum in agricolarum notitiam peruenisse scribit Plinius, quarum nomina ab earum forma & sapore potissimum desumpta sunt: nam quæ à locis & inuictoribus petuntur explicare, infiniti esset laboris.

Oliua pausia Catoni à pauiedo dicta, id est tundendo, dum oleum exprimitur: aliter enim hæc oliua ex se oleum non faceret, inquit Seruius in eum locum Virgilij, Et amara pausia bacca. hoc est, inquit, viridi: nam ex pausia viridi, exprimitur oleum: alioqui bacca est iucundissima.

Orchites oliuæ, dictæ maiores: & à similitudine testiculorum appellatæ, vt arbitror. Virgilius, Nec pingues vnâ in faciem nascuntur oliuæ Orchites, & radij, &c.

Grandis tamen olea Varroni dicitur orchas siue orchitis, antiquis archemora, quæ melius ad escam quam ad liquorem stringitur: nam omnis oliua maior ad escam, minor oleo est aptior. Bac-

cæ enim oliuarum nonnullis regionibus conuiuiorum epulis præparantur.

Rádus vocata oliua, cibis gratissima est: vnde etiam á Virgilio loco superiore plurimum commendata. Tria enim hæc tantum genera oliuarū facit, atque his contentus est quæ descripsimus: nā ea rastros, aut curam nullā desyderare tradit.

Oliuæ præterea colymbades ideo vocātur (inquit Barbarus) quoniam oleo suo puræ, hoc est sine accersita commendatione innatant, & veluti vrinabundæ fluitant.

Halmades verò oliuæ dicuntur, quæ muria propriè condiuntur: etiam si Græci nōnunquam eiusmodi nomina confundere soleant.

Sunt & Nebrides appellatæ Iulio Polluci, quoniam enatent.

Sūt & pitirides, hoc est furfuracæ: quæ in vsum hunc stringuntur, antè quàm maturescant.

Oliuas autem, quæ inter copiam bonitatēque incipiente bacca nigrescere colliguntur, nostri vulgò vocant drupas, Græci drypetas.

Possem hoc loco enumerare oliuam Liciniam, quæ omnium optima est, inquit Plinius: & maiorem olei copiam reddit: item & syrias, fidicinas, cominias, sergias, regias, & mille alias huiusmodi oliuarum species: nisi hæc omnia Columella latissime lib. 6. & Plinius lib. 15. pertractassent. quæ loca quisque apud se legat.

Oliuæ, inquit Plinius, constant nucleo, carne, oleo, amurca. Nucleus à quibusdā sanfa, à quibusdam naucum appellatur, vnde prouerbiū naucifacere. Oleum, ipsius oliuæ succus est. Caro

ipsa substantia. Amurca verò à Græcis amorge dicta, Latinis sæx oliuæ appellatur: éstque ipsius oliuæ expressæ sanies, sidénsque retrimentum.

Veniamus ad oleum, & legendarum oliuarum, atque olei faciendi vocabula: quibus explicatis, olei quædam genera docebimus.

OLIVARVM liquor oleum est, cuius in torculario conficiendi rationem, agriculturæ scriptores antiqui fusissime tibi aperient. Nobis sit satis ad eos intelligendos, vocabula ipsa exprimere, quæ huic rei commoda videbuntur, & quibus vtuntur ipsi authores.

Itaque ab oliuitate incipiemus. Oliuitatem autem siue oleitatem, Cato & omnes agriculturæ scriptores appellarunt, legendarum oliuarum tempus: quemadmodum vindemiam, vini faciendi. Vindemia, inquit Cato, & oleitate facta, patibulo omnia in sua quæque loca reponenda. Est autem patibulum instrumentum huic rei aptum.

Oliuarius siue olearius, qui torculis, in quibus oleum fiebat, & ipsi oliuarum expressioni præerat. *le pressoirier.*

Leguli ab iisdem authoribus appellati sunt: oliuarum lectores: legebantur enim manu oliuæ & distringebantur, siue stringebantur proprie apud eosdem, cum decerpebantur & colligebantur manu. Vnde strictiæ oliuæ appellabantur, quæ manu lectæ erant: ad differentiam cadiuarum, hoc est quæ sponte sua, vel coactæ ex ipsa olea deciderant: & fracidarum, quæ emarcuerant, & iam pridem collectæ fuerant. Fracescere enim dicuntur oliuæ, quæ collectæ, calore & vetustate putrescunt.

Fraces vero oliuarū vocat Cato, ipsam oliuæ carnem, & corticulum vnde postea fæces exeunt.

Factores dicti, qui oleum faciebant, & torculum mouebant, vt ipsa expressio fieret: vnde factum olei appellarunt authores, quantū olei vna torculi expressione, & vno macinate, quod vocant, exprimi poterat.

Capulatores præterea dicti, qui capulis oleum deplebant, hoc est euacuabant: vnde decapulare oleum dictum est. Erāt autem capulæ, vasa vtrinquæ ansata, ad oleum è lacu in dolia trāsferendū. Lacum vero appellabant cupam, in quam oleum defluebat ex torculo. Sed de vasis olearijs videto libellum nostrum De vasculis ex Bayfio.

Ostum insuper antiqui vocauerūt, quod ex vno facto olei reficitur: Factū verò dicebāt, quod vno tempore conficerēt, quem alij centum sexaginta modiorum, alij centum viginti faciebant.

O L E U M gleucinum antiquis dicebatur mustū & primum, ac quod expressum erat antè quàm oliuæ calcarentur, & fortius premerentur: nam gleucos Græcis mustum significat: hoc suauissimū omnium, & idem tenuissimum protinus deplet capulator, & ab alijs secernit: appellaturque etiā id oleum postea cibarium, quod in cibis veniat.

Oleum deinde tertium appellatum, quod trifatili mola celerrime, & volubiliter in gyrum rotata, post primā expressiōē deinde elicitur & exprimitur: inde secundarium etiam appellatum, & protinus in alia vasa transfunditur: estque cōmuni vsui commodum, non autē esui. Quod vero vltima conculcatione elicitur, & tertiatione (sic

enim vocabimus) multo deterius oleum euadit: ac combustioni & lychnis aptissimum.

Oleum omphacinum, quod ab acerba baccarum lanugine exprimebatur: baccas enim acerbissimas, quemadmodum vuas Græci oliuas omphacas appellarunt.

Alia præterea infinita nomina desumit oleum ab ijs rebus, cum quibus vel ad solem, vel ad ignem infunditur & incoquitur. Cuius generis infinitæ sunt species apud pharmacopolas: ut à ruta rutaceum, item rosaceum, violatum, iasminum, & cætera id genus: quæ quia potius medicorum esset persequi quàm grammaticorum, ipsis medicis relinquendo. Sunt etiam alia nomina ab urbibus petita & locis, in quibus optimum oleum fiebat, unde etiã facultatem & vires quasdam habere credebatur: ut Sabinum à Sabino agro: non autem herba Sabina. Erat autem Galeno & medicis antiquis summo in pretio propter dulcedinem, & facultatem simplicem, non mixtam: oleum Hispanum vel Hispaniense Paulo calidius: & permulta huiusmodi, quæ diligens lector & eruditus ex Plinio & Dioscoride requirat, si volet.

Ficetum.

Absoluta earum arborum descriptione, quæ fructus intus ossibus munitos producant, nunc ad alias transeamus, & ab ipsis ficorum differentiis incipiamus: prius quàm ad morum & nuces sermo se conuertat.

Ficum arborem Græci sycen & sycada nominant: quanquam sycada nouellam ficum fere intelligunt, vt Iulius Pollux inquit. Gallis dicitur vulgo, *ung figuier*.

Ficus omnis tam vulgaris, quàm peregrina & syluestris, breui est ferè nec procero caudice: quàmquam amplissimæ quædam inueniuntur, vel pyris æmula magnitudine. Cortex ei læuis, laciniosa folia, & cruciformia: hoc est, vt Theophrastus inquit, *σκλοποειδῆ*, nisi quis *κορωνοποειδῆ* magis legendum putet: nam, inquit Hippocrates, verè sūt folia fico pedibus cornicis similia. Cætera quæ ad insirionem, & reliquam eius arboris descriptionem spectant, ex bonis authoribus habeto. Nos omnia referre non possumus.

Caprificus, inquit Plinius lib. 15. cap. 19, è syluestrium genere ficus est, nunquam maturescens. Erinos à Græcis vocata, quòd in Erineo Thessaliæ oppido primùm apparuerit, vt Photioni placeat. Longe validior est quàm ficus, & nodosior: provenitque è ficarijs granis, quæ Græci *κεγκραμίδες* vocant.

Sed & caprificari dicuntur arbores fici (inquit Palladius) cum suspenduntur fici ex caprifico, lino velut ferro pertusi. si hoc desit, abrotoni virga suspenditur: aut callum quod in vلمي folijs inuenitur: aut arietina cornua circa radices arboris obruuntur: vel truncus arboris quo loco turget scarificandus est, vt possit humor effluere. hoc quidem nostris caprificatio, à Græcis erinasmos siue sycasmos appellatur.

Ficus AEgyptia Athenæo, Theophrasto morus

AEgyptia, Celsus morosycon aliquando etiam sycaminon appellat: Dioscorides & Galenus sycomorū. Mistæ naturæ arbor, quo modo si ex ficu & moro arborem seras: amplissima quidem, ficus similitudine, largo succo, folijs moro quāproximis: cui etiam magnitudine & cōspectu proxima est. In Alexandria (inquit Galenus lib. 2. Alimentorum) sycomorī plantam vnā cum fructu prospexi, quæ paruæ candidæque ficui persimilis est. Nulla hic fructus acritudine constat, perexiguæ dulcedinis particeps, facultate ad humidius frigidiusque nōnihil declinat, veluti mora. Quinimo inter mora & ficus, hunc non temere mediū quis ponat, atque hinc mihi nomen inuenisse videtur. Deridiculi nanque sunt, qui ex eo fructum hunc sycomorū appellatū dictitant, quod paruis ficubus assimiletur. Haftenus Galenus. Itaque neque ij qui sycomoron, quasi ficū fatuā, neque ij qui quasi paruā ficum dictam putāt, recte cōmentati sunt: quando & ipsa ratio iudicet fructum mediij cuiusdam esse saporis inter morum & ficū, & ipsa arbor moro conueniat, cū ficus gerat: quos quidē non ē ramis dependēre videas, quēadmodum in reliquis arboribus: sed ex ipso arboris caudice. Nascitur (inquit Dioscorides) plurimū hæc arbor, in Caria, Rhodo, locisque nō multi tritici feracibus, vbi prouentu fœcundo iuuamentū adfert, cū annonæ caritas premit. hodie tamen Rhodo familiaris esse desijt. Tradit autem Vlpianus hanc arborem in Niloticis aggeribus esse frequentem, grauitérque in eos animaduerti qui sycomorum exciderunt. Visa est nobis sycomorus Parisijs in

horto Gotofredi cuiusdam pharmacopolæ, diligētissimi herbarū & arborum, quæ apud nos rariores sunt, indagatoris & cultoris: vt sua diligētia multis in hac re profuerit, qui id vnū desyderabant. Vnde nō mediocri laude dignus videtur.

Sycomoro similis est, inquit Barbarus, quæ vocatur Cypria ficus, in Creta: nam & ipsa trunco pomum fert, & ramis, cum in crassitudinem adoleuere. distat autem à priore, quòd germinae mittit sine vllis folijs, radiculæ similia, cui fructus quasi cuspidis accessu præpilatur, quoties germinat, nempe quater: suosque grossos nō perficit, nisi immaturi pomi plaga emissio lacte. Arbor est, populi albæ caudice, magno, folio vlmī, pomo magnitudine pruni, ficus dulcedine, grossorum callo: fructus quaternos fundit, toties & germinat. Plura ex Ruellij commentarijs.

Ficus pelagica in mari nascitur sine folio, nec magnitudine prestanti, cortice puniceo.

Ficus aliud genus (inquit Barbarus) pomum super folij dorsum ferentis, circa Idam ostēditur, & ob id opisthocarpion vocatum, Idæi cognomine. Ramosa, leuis, enodisque, superius comosa in orbem. Color folio & cortici liuens ac viridis, foliū tilia per omnia, sed molle: flos mespilaceus, & cū mespilo erūpens: ficus rubra, magnitudine oliuæ, rotundior, sapore mespili, Alexandrinam vocant.

Ficum Indicam Onesecritus apud Strabonē celebrat. Arbor est (inquit Barbarus) frōde superna luxuriās, decora specie, fornicatōque ambitu lasciuiēs, & pulchrè sepes hortorū aut arbustorū opacās, & quasi vallo muniēs. foliorū latitudo Ama-

soniæ peltæ habet effigiem: ea causa fructum integens crescere prohibet, rarûsque est fructus, nec fere ciceris magnitudinem excedens, ficus similitudine atque sapore, cum per folia sole excoquitur. Parce admodum pro magnitudinis gestiente desyderio fructificat. Gigniturque circa Acesiam maxime amnem. Plura ex ipso auctore petito. Nunc ad fructus veniendum.

FRUCTVS ficorum arborum, fici etiam appellantur, sed alia declinatione: quemadmodum probe Valla lib. eleg. primo descripsit. Itaque nunc ad eorum genera.

Grossuli siue grossi, Græcis olynthi, proprie dicuntur ficus primitiue, aut, vt vult Macrobius, nûquam maturescētes. Colum. lib. 5. cap. 10, Si voles ficum, quamuis non maturam, seram facere: tum grossulos, priorēve fructum decutito. Nonnulli autem (inquit Barbarus) sic distinguunt, vt ficus primò sit olynthos, deinde pheix, postea cycon, postremo ischas: nā ischades, aridæ fici sunt, quemadmodum & caricæ, *figues de careme*. Inuenias tamen apud Græcos ischadas recentes & veteres quoque ficus vocari.

Ficum quædam à colore nomen habent, vt albæ: quales sunt serinæ omnium deliciores, vnde cognomen etiam habuerant, nostris Massiliensibus fortè conferendæ: sunt & quæ nostris albiceratæ vocantur, etiam albæ: nigræ vero cū messe maturescētes & vindemia, quæ & serotinæ appellatæ sunt, & duricoriæ Macrobio, à corio duro. Huius generis sunt & præcoces quædam nigræ, quales sunt Tiburtinæ & Rhodiæ. Præcoces

autem à Græcis prodromi appellantur, hoc est præcoquæ & præcurrentes, quales sunt quæ ex Laconico ficorum genere producuntur. Plinius libro 16. ca. 26, Ficus & præcoces habet, quas Athenis prodromos vocant. Purpureas verò ficus fert Aegyptia arbor. Sunt & Lydiae purpureæ, de quibus suprà.

Infinita sunt alia ficuum nomina ab inuentoribus, patrijs, & forma, petita. quæ qui diligentius scire volet, habeat in promptu Plinij locum, & Hermolai commentaria.

Vnum hoc addã præterea, puerorũ causa, folliculos ficuũ à Græcis appellari γράιας, à Latinis grumas: semina autem & minuta grana, quæ in ipsis continetur, ijdem Græci κεγραμίδας vocāt. Ficorum autem decoctũ plærique, inquit Paulus, Siraũ appellauere, cui & defruto quoque nomẽ est. Haftenus de ficis. Nũc ad mora tanseundum.

Mororũ ordo.

Morum arborem Græci sycamineam & syceã, & sycen, Media Comœdia (inquit Barbarus) sycaminon vocat & pomũ & arborem: sed pomum neutro, arborem masculino genere: vt apud Iuliũ Pollucem notatum legitur. Hippocrates interdũ ipsam arborem sycen, interdum moreõ appellat. Galli vulgo, *ung meurier*: cuius descriptionem longiorem in tam vulgari nobilitate, nõ est opus hoc loco inserere. flos ei vitiginei modò lanugineus: fructui toti, nec postremis tantum insidens, in

G. j.

medijs inculcatus: nec singulas partes ambit, fallens interdum propter lanuginem, vt concerni nequeat. Cæterum mororū folijs Itali atque adeò Galli bombyces enutriūt, sericeam illam texturā, quam vulgo setam vocamus, cōficiētes. huiuscemodi enim folijs præsertim tenuioribus, & ex ipsius arboris cacumine desumptis summopere delectantur: quæ vbi per aliquot dies depasti sunt, vt iam per totum corpus pellucere videātur, accibum fastidire, & super ipsis folijs fila quædā capite eleuato producere: tum corniculis ex charta nitidiore concinnatis impositi, sese sua textura inuoluunt atque implicant, vt iam amplius nō appareant, nisi post aliquot dies aqua tepida filo retexto, & arte diligenti explicato. Quod vbi factum est, iam non amplius apparent vermiculi, sed veluti corpus quoddam informe, oblongum, ruffum, & theca turbinata, ac circulis quibusdam distincta, conuolutum: quibus motus quidam viuētis intus animalis sentitur. Tum demū ad solem positi vermiculi, tandem rugosam tunicam exuunt, & veluti in quosdam papiliones commutantur: qui inter se more suo commixti, infinitas ouorum myriades generant, ac super chartis aut folijs huiuscemodi oua tenacissime inserunt: quæ primum flaua, deinde verò anno postero, & vere nouo ad solem posita nigrescere videntur: ex quibus nigerrimi primū vermiculi prodeunt, qui postea foliorum pastu albicantes conspiciuntur. Atque hæc quidem nos aliās per ætatis delicias, & iuuentutis nostræ crepundia sumus experti. Sed ad rem.

FRVCTVS mororum chartilagineus, statim ab ortu candidus, cum pubescit, rubet: vbi maturuit, ater est. Sic & succus eius euariat, primùm enim acerbus & aquosus, mox lenior & lentè rubens, deinde vero vinosus, sanguineo colore manus inficiens. Sicaminon Græci pomum ipsum vocant: Galli vulgo *des meures*.

Atque hæc tantum mihi videntur pueris dicenda super hac re: nam quæ supersunt mororum genera in rubis crescere solita (vnde Virgilius ait, Hærentia mora rubetis) ea fusissimè in hortuli nostri sepibus explicauimus, vt iam alia explanatione egere nō videantur. Præterea, quæadmodum sæpe diximus, plura qui volet, desumat ex Ruellio. Iam verò ad nucum differentias veniamus. Nam castaneas in Syluam asseruabimus, quandò sunt ex glandium genere.

Nucum ordines

AC DIFFERENTIAE.

Iuglans, dicta nux, arbor nobis vulgatissima & frequens, quasi Iouis glans literis intercisis, siue quasi dios balanos, pro diu glans: quanquam dios balanos castaneã Dioscoridi significet: de qua in Sylua suo loco dicturi sumus. vel potius à iuando dicta, vt quidam interpretantur: Græcis caryon basilicon vocata est, id est regia nux. Interdum Persica Euboicæque: Gallis noierus, *ung noyer*. Sed caryon à Græcis dicta, à capitis graue-

G. ij.

dine, quæ caros Græcis, Latinis veterum appellatur: nam & arborum ipsarum foliorumque vires in cerebrum penetrant, hocque in cibis earum nuclei, præsertim sicci minori momento faciunt. Dicta quoque regia, quod eam reges è Perside transtulerunt: qua etiam ratione Persicæ nuces appellatæ. Arbor est notior quàm vt repræsentari longa interpretatione debeat. Itaque ad alias differentias veniendum, prius quàm fructus enumeremus.

Nux auellana, prius abellina, inquit Plinius, patrio nomine vocata, ab Abella oppido, vnde primùm allata, qua etiam ferè ratione appellata est nux pontica: eadem est arbor quæ & corylus: vnde coryletum, locus dicitur nucibus auellanis, & corylis confitus, vulgo, *une couldroye*: & frutex ipse, *ung couldre*: quibus fruticum generibus scætet nostra Gallia. Itaque descriptione longiori nõ eget. Alia autem nomina, in declaratione fructus, hoc est ipsius nucis, aperiemus.

Nux Græca, ea est quæ & amygdalus arbor dicitur, siue nux amygdala: quod Columellæ & Plinij locis collatis facilè colligitur. Cato has nuces certè Græcas nominavit: quare non ab re venit in dubiũ, an hæc arbor fuerit in Italia eius ætate. Quidam tamen eas in iuglandium genere seruant: omnes quoque Thasias nuces appellari volunt. Cæterum amygdalam siue amygdalum (nam vtrunque pro arbore dixit Plinius) ideo Græcis nominari testis est Herodianus Alexandrinus, quod post viride putamen, fructus ipse multos scarificatus ostendat, & in rimulas dehi-

scat, quas Græci amychas vocat. Nomen Græcum hodie apud nos retinet: sed paulum vulgus declinavit, amandas vocans, *des amandes*: & arborem ipsam, *ung amandier*: cuius descriptionē petito ex Ruellio.

Macer, quidam recentiores vocant corticem arboris magnæ, quæ ex India conuehitur: vnde & xylomacer eiusdem arboris lignum vocavit Plinius. Qualis autem hæc fuerit arbor, incomperatum habuit. Nonnulli diuinarunt esse eius arboris lignum & corticem, quæ nuces odoratas fert: alij vero potius odoratæ illius nucis, quam caryon myristicon, id est vnguentariā nucem nominant, corticem esse dixerunt (inter quos est doctissimus ille Manardus, rei medicæ peritissimus) qui in officinis sæpe ipsam nucem conuestire visus est. Nucis autem huius, quam myristicam, id est vnguentariam, vel moschatam, aut odoratam appellari quotidie audimus, arbor vulgari persico (inquit Ruellius) similis traditur: roseo flore, & nuce, quam proxime in fructibus declarabimus: eiusdem propè effectus, cuius & cariophyllon.

Est & palma quædam Indica, præmagnas ac pingues nuces ferens, quas nuces Indicas recentioribus appellari, Græcis carya Indica, quotidie audio: cuius oleum butyro præfertur succi bonitate. huius etiam veteres meminerunt. Nunc ad fructus.

FRUCTVS regiarum nucum varij sunt, varisque particulis obtekti & cōmuniti, quas omnes Plinius proprijs suis vocabulis explicat. Vnde puluinatum nucis calycem vulgus appellare

G. iij.

poterit *lescaille dune noix*: quòd in puluini quamdam veluti formam factus sit. putamen deinde ligneum nucis, id erit, quod vulgus vocat *la coquille de la noix*. Postea autem qui subsequitur nucleus, quòdque tenerum & gustu optimum in nucis duobus putaminibus, bifidis veluti carinis opertum comprehenditur: id est quod vulgo vocatum est *le cerneau*. Vnde etiam nucleum acini vocat Plinius libro 23. cap. 1. quod vulgo pipinum vocamus, *le pepin*. Nucleorum autem (inquit idem) in nuce quadripartita distinctio, lignea intercurfante membrana. distinctionum autem illarum quamlibet partem vulgus coxam appellat, *la cuisse dune noix*. Cæterum proprie satis visus est mihi appellasse Suetonius ocellatas nuces, promultis foraminibus distinctas: quod in ligneo putamine satis apparet. atque hæc puerorum causa dicta sint.

Sola huius pomi generum differentia (inquit Plinius) est in putamine duro, fragili, tenui, crasso, multiloco, simplici. Vnde Tarentinarum nucum (quæ à Tarento Neapolitano oppido dictæ sūt, quòd in eo loco optimæ nascerētur) duo genera rursus alijs nominib⁹ distincta inueniūtur. aliæ enim à corticis siue putaminis mollitiæ mollescæ appellatæ sunt, quòd ex eo genere, hoc est ex Tarëtinis, molliores sint, & nudæ cortice, vel molli vel fragili putamine prodeant. Aliæ verò quæ duro sunt cortice & amplissimæ, ac minime rotundæ: à frangendi mora, moraciæ & moracillæ appellatæ. Sūt tamē qui putent Tarentinas propriè de molluscis intelligi: atque ita dictas à Ta-

rento, quod Sabinorum lingua molle significat: unde Tarentinos dictos putat Varro: quod & Horatius confirmat, Molle Tarentum appellans: sic nux Tarentina dicitur, quæ ita mollis est, ut attrectata statim frangatur. plura collegit Ruelius. Sūt & Galbæ & Caluæ, & Thasiæ, & Albenses nuces antiquis appellatæ: de quibus videto Plinium.

Nucis auellanae fructus hodie quoque nomen retinet: appellat enim vulgus nostrum nuces, quas corylus fert maiores & rotundiores, *des auellines*: minores autem & turbinatiores nuculas, *des noisilles, ou des noisettes*. In Asiam Græciâque venerunt è Ponto, ideoque Ponticæ nuces appellantur, etiam Heracleoticæ, & leptocarya Græcis dicuntur: Latinis Prænestinæ, à Præneste nobili Italiæ oppido: quas conditas ollis in terra virides feruari Cato tradit. Has mollis quædam integrit barba & calyx summatim fimbriat: sed putamini nucleis que solida rotunditas inest.

Amygdalæ, siue Græcæ nucis origo, in arbore iam dicta est. Fructus (inquit Plinius) gemino protegitur operimento, puluinati primum calycis, mox lignei putaminis, cui solidus subest nucleus, acriore etiamnum obductus callo. Cuius duo sunt genera: nempe amarum, & dulce: hoc autem suavius, illud vero salubrius esse creditur.

Amygdala Naxea, ex insula Naxo veteribus Græcis maxime commēdabantur. Secundas partes sibi vendicauerāt Cypria, quæ præter morem cæterorum quæ gignūtur alibi, repando cacumine prodeunt. Cætera nomina apud authores in-

G. iij.

ter legēdum reperies. Mirum hoc mihi videtur, quòd hæc arbor inter cæteras, apud Britānos nulum edere fructum conspicitur, aut posse illic crescere. Cæterum de noua progenie, quæ ex amygdalo seu nuce Græca & Persico inuisa priorib⁹ seculis exorta est, dictum est à nobis satis in malo Persica. Quo etiam in loco de nucepersica arbore & fructu, quem persiconucem, siue potius curtato nomine pesconucem vulgus vocat, abundè tractauimus.

Moschocaryon, quod & moschocarydion Græcis dicitur recētioribus, India mittit (inquit Ruellius): nos ea imitatione nucē moschatam nominamus, *noix muscade*, ou *noix mugnette*. Ea mēbranofo primum vestitur calyce, foliato, fissili, per extrema fimbriato, flauescēte: mox lignoso tegitur putamine, fragili: cui compactilis subest globus nuclei vice, ab vmbilico læuibus quasi strijs extrorsum virgatus, fungoso corpore, cæterarum nucum more minimè carnosio. Sed coalitu intus rariore, intercurfantibus venis rubris, candicantibus interuenijs. Tota dum recens est, succo pingui & oleoso madet, sic vt in vnguentum exteri possit: vnde multis myrepfica, id est vnguentaria nux dici cœpit, & si pungatur aculeo, aliquid remittit humoris. Ea iucundissimum spirat odorem, ita vt cum cinnamomo de odoris suauitate certet. Aecius caryon aromaticum, id est odoratam nucem vocat. Iam in ganeam & culinas descendit, vt opsonia suo sapore cōdiat, nullūque temerè condimentum sine hac moschata nucula struitur. Hæc omnia ferè ex Ruellij cōmentarijs.

Caueto autem, ne cum quibusdam putes eandem esse moschatam, vel vnguentariam nucem cum balano myrepfica, hoc est glande vnguentaria: fructus enim est fruticis myricæ similis, magnitudine auellandarum nucum: cuius cortice expresso, quemadmodum ex amygdalis amaris excipitur liquor, quo in pretiosa vnguenta vice olei vtuntur. Itaque longè differt à nostra nuce moschata. Plura ex Ruellio.

Nucis Indicæ fructus vulgo vocatur, noix D'inde: cuiusmodi plures ex officinarum ostijs dependere apud seplasiarios conspiciuntur. Globum prægrandem gerunt, circinnatæ rotunditatis, inuolucris intectum, calloso primùm herbaceoque cortice, intus villoso, tenui tunica exterius vestiente: qua extrita, solutus in capillamenta fatiscit, capaci subtus orbe, duro, lignoso: triplici foramine, concauo anfractu, grandi, nullis loculamentis interstincto: dulci intus, cum recens est, liquore: nucleo molli, candido, carnosio: cum inueterauit, cartilaginoso. Ruell. Cæterum nucis Indicæ nucleo matronas Venetas nobiliores vt solitas audiuius, vt pinguiore & saginatiores suis viris appareant.

Restat pinea nux describenda, de qua cum sua arbore, in Sylua tractabimus.

PISTACIA etiam in nucum genere habetur: quæ L. Vitellus censor (inquit Plinius) in Italiam primus intulit è Syria. Nam ea in Syria propriè etiã hodie nascuntur, & inde aduehuntur: crescunt in arbore omnino nuda, præterquã ramorū cacuminibus. Hæc enim comantur dēsiore folio,

angusto & subruffo, ex furculis dependentibus, pineæ nucis similitudine. Arbor est (inquit Barbarus) folio maiore quàm lentisci, in ordinem vtrinque disposito, distantioribus frondium interuallis. Marem in hoc genere accipiunt, cui sub corio velut ossei longiores latere videntur testiculi. Huiuscemodi arborē vidisse memini Venetijs, permultis in locis: itē etiā Parisijs in æde diuæ Mariæ sacra: atq; adeò in horto Renati Bellaij Cenomanensis episcopi, nunquam fatis in herbarum & arborum rariorum cultura, laudati: ac suprâ quàm dici possit, eius rei studiosi: quo nomine haud paruum cōmoditatem attulit nostris hominibus, quibus hactenus non solum meliorum quarundam herbarum cultura & forma, sed etiam ipsarum vera nomina fuerant prorsus incognita. Porro pistacia Nicander Colophonius psittacia vocauit, & alius Nicāder pilistacia: sunt etiam qui listacia: vulgus pharmacopolarū barbarè vocat fistuca, vel fisticorum grana, Venetis atque adeò Italis cōmunia, & post cibos in vltimis mensis expetita auellandarum loco.

Hæc sunt, quæ iuuenibus nostris, bonarum literarum studiosis, pollicebamur, quæque nostra (qualis esse potuit) diligentia, & doctorum virorum imitatione dici potuerunt. Neque verò id nobis attribui à quoquā desyderamus, quòd hæc inuenerimus, quòd etiam priores descripsimus: nam & hæc omnia iam pridem ab eruditissimis authoribus tractata fuerant: quorum interpretationi & facilitati, qui deinde nostra ætate subsecuti sunt literatiores viri, dederunt operā: inter quos

Ruellius noster adscribendus venit, totius Gal-
liæ in huius rei cognitione facile princeps. Ille
vero doctis & eruditis, doctè & eruditè scripsit:
nos autem rudibus & puerulis, rudi Minerua, &
quæ ipsos adhuc rudes maxime decet, faciliora
quædam, facili etiam ordine descripsimus. Atque
hæc quidem si minus placebunt delicatioribus &
morosis quibusdam ingenijs, sciant etiam nos si-
bi non dedisse operam: sed si nostris iuuenulis
grata erunt (vt sanè esse poterunt) futurum est vt
propediem Vinetum suum, Syluā, Pratum: præ-
terea etiam, si fieri poterit, Agrum excultū habe-
ant. Quæ nisi illis vtilissima esse crederemus, nū-
quam bonas horas in hisce puerilibus negotijs
consumere, induceremus in animum.

INDICES DVO, QVORVM PRIOR
 Latinas dictiones omnes, quæ in Seminario de-
 scriptæ sūt: posterior Gallicas & vulgares voces
 complectitur, certo literarum ac numerorum
 ipsis paginis adnotatorum ordine.

A

Abella oppidum	100	amentum	27
abellina nux	100	amerina poma	51
ablaqueare arbores	37	amurca	90
ablaqueatio	ibidem.	amygdala Cypria	104
Acacia	71	amygdala naxeia	104
achrades	66	amygdala nux	100
achras	65	amygdalina pruna	72
acida granata	56	amygdaloperfica	64
acida poma	54	amygdalus arbor	100
acrodrya	48	Anthedas	83
actia cerasia	76	antheles	28
Adobruere arbores		Apios, adipios	65
37		appiana poma	50
AEstus	87	aproniana cerasia	76.
Agere coliculum	13	77	
agere folia	26	apyrena mala	56
agere radicem	19	Arantia	57
aggerare arbores	37	arbor	12
agrestis malus	49	arbor læta	13
agrielæa	86	arbor pomifera	13
Alcinoi sylua	46	arbor vetula & nouvel-	
alexandrina ficus	95	la	5
Amamelis	83	arborator	15
amarisia cerasia	76	arboris partes	17
		arbores frondentes	27

arbores quando fructu
 indui dicuntur 27
 arbores sub malorum
 generibus cōtentæ 55
 arborescere 14
 arboretum 15
 arbuscula 14
 arbustiū vites 15
 arbustiū locus 15
 arbusto 15
 arbustum 10
 arbutus 16
 archemora 88
 armeniaca malus 67
 armeniaca pruna 72
 Attondere 39
 Auellana nux 100
 aurea mala 57
 austerā poma 52

B

Balanus myrepica
 105
 balauſtium 56
 balsamina poma 54
 Bericoca 62
 Bifera malus 49
 bigemmes & trigem-
 mes palmites 25
 Bombycū textura 98
 Brion 23

C

Cachrys 27
 cæciliana cerasia 76
 calamila, calamania 53
 calamus 29
 calistephanos 86
 calyx nucis puluinatus
 102
 camerina poma 51
 capenduta poma 53
 capere radicem 19
 capillamenta 18
 capillata, siue capillaris
 radix 18
 caprificare 93
 capulæ 91
 caprificatio 93
 caprificus 93
 capulatores 91
 carices 96
 caro oliuæ 90
 carpere frondes 40
 caryon aromaticū 105
 caryon basilicū 99
 caryon Indicum 101
 caryon myristicon 101
 castinia poma 54
 castrare arbores 40
 caudex 19
 cauernosa radix 18
 κεγκραμίδες 93.97

cerasetum	10.73	citrea mensæ	58
cerasia actia	76	citromela	58
cerasia aproniana	76	κλάδος	25
cerasia duracina	76	claudiana poma	50
cerasia Cæciliana	76	Coccomelea	71
cerasia laurea	76	codicilli	20
cerasia Macedonica	76	codymala	59
cerasium	76	colere seminariū biden	
cerasus arbor	75	tibus aut sarculis	12
ceratia	79	coliculum agere quādo	
ceration	80	arbor dicitur	13
ceratonia	79	colligere fructum	27
ceronia	80	collucatio	41
Chamæcerasus	77	colymbades oliuæ	89
chamæmespilus	84	comaros	16
chrysomeliana	61	conditanea olea	88
Cibarium oleum	91	conditiua poma	51
κκίδες	28	cor mali	23
cicum	56	cordia cerasia	78
cicures animantes	57	corinthiaca poma	51
cidoniatum	60	corna	82
cidrea	66	cornelia	81
circummunire plantas		cornorum ordo	81
arborum caueis	36	cornus Indica	82
circundare muscum ra-		cornus mascula & fœ-	
dici talearum	43	mina	81
circunfodere arbores	36	corona frondea	24
circunfodere radicē	19	cortex	22
circūfossor, circunfossu-		corticosa radix	19
ra	36	coryletum	100
κίτλαρα	28	corylus	100
citrea mala	58	cotinos	86

cotonea malus	59	disfrarare	40
Crania	81	Dolabelliana pyra	67
κτιδόνες	22	Drupæ	89
Curtipendia poma	53	dripetæ	89
Cycon	96	Duracina cerasia	76
cydonia mala	59	duricoriæ ficus	96
cydonia mascula, cydo-			
nia foeminina	60	E	
cydonia syluestria	61	Elæa	86
cypria amygdala	104	elæagnos	87
cypria ficus	95	Emplastratio	42
cytinus	56	Epymelis	83
D		epymelides	16.71
Decacuminare	40	Erinaſmos	93
decerpere fructum	27	erinos	93
decorticare, excortica-		Excitare incilia	38
re	22	exturbare arborem	40
decumiana pyra	67	F	
decussis	34	Facere aut fodere scro-	
delibrare	23	bem	37
delibrare arbores	38	factores olei	91
demittere taleas	43	factus olei	ibidem
delphica poma	51	fæx oliuæ	90
deponere semina scro-		Fibræ	18
bibus	9	ficetum	92
Differētię malorū	49	fici	96
differentię pyrorum	65	ficus Aegyptia	93
diacydonium	60	ficus Alexandrina	95
dios balanos	99	ficus albæ	96
disponere arbores in		ficus arbor	93
quincuncem	33	ficus Cypria	95
		ficus duricoriæ	96

ficus Indica	95	fructum colligere & de	
ficus Massilienses	96	cerpere	27
ficus nigræ	96	fructū percipere ex ar-	
ficus nouella	93	boribus	27
ficus pelagica	95	fructus	27
ficus præcoces	96	fructus Indicę nucis	105
ficus serotinæ	96	fructus mororum	99
figere humo plantas fe-		fructus nucum	102
races	33	frutetum	17
fistica	106	frutex	16
Flagella	30	fruticare	17
florere	13.27	fruticosa planta	16
flos	26	G	
Folia agere	26	Gallæ	28
folium	26	Gemella poma	51
Fraces	91	gemma	25
fracescere	90	gemma , gemmas a-	
francetura poma	54	gere, gemmascere.	25
frondare arbores	24.39	gemmas trudere	26
frondaria fiscina	24	genera malorum	49
frondatio	39	generosa malus	49
frondatores	24.39	geniculata radix	18
fronde leuare	39	germen	26
frondea corona	24	germinare	ibidem.
frondere	15	Glans vnguētaria	105
frondescere	24	gleucinum oleum	91
frondosus ramus	24	γαίαι	97
frons	23	granata acida	56
fructificare	27	græca nux	100
fructiferæ arbores	27	græcula poma	51
fructu indui	27	grossi, grossuli	96

grumæ	97	interlucatio	41
Guinea	78	interpurgare	40
gummi Arabicum	87	interradere	39
H		inuertere scrobes	38
Halmades	89	Ipnos	23
Heracleoticæ nuces		Ischas	96
103		Iuglans	99
Hibiscus	14	iuiubæ	50
Hordearia pruna	71	iuliana cerasia	76
I		iuliana pruna	75
Ilex	11	iulus	28
ilicetum	11	L	
Incalmare	30	Lachryma	23
incilia	38	lacus	91
indica ficus	95	læta arbor	13
indica nux	101	lapidosa poma	52
indicæ nucis fruct ⁹	105	lanata poma	50
induitur segetibus ter-		Leguli oliuarum	90
ra	27	leptocarya	103
induuntur fructu arbo-		Liber	22
res	24	lichen	74
inhumare taleas	43	lignescere, lignū	22
inoculatio	42	limonium	59
insecare	39	limosa radix	18
inserere	42	Luxuriat arbor	14
inserere semine	42	M	
insita malus	49	Macedonica cerasia	
insitum	30	76	
intercidere	40	macer	101
interlegere frondes	40	mala aurea	57
interlucare	40	mala citrea	58

H.j.

mala insana	55	manliana poma	50
mala muluiana	61	Medica malus	57
mala Neapolitana	61	medulla	23
mala punica dulcia	56	melapia	50
mala sorba	83	melea	47
mala struthia	60	melenfana	55
malacria poma	54	melimela	61
malicorium	56	merasia	78
malina pruna	72	mespilorum ordo	82
malleolaris virga	25	mespilus arbor	83
malleolus	25	metare arbores	33
malorū genera & diffe		metatio vinearum	33
rentiæ	49	metatores	33
malum granatum	56	Mimecyla	16
malum hesperinum	57	mirabilia poma	54
malus agrestis	49	mitia poma	52
malus arbor	47	mittere radicem	19
malus armeniaca	61	mixa	72
malus bifera	49	Molluscæ nuces	103
malus cidonia	59	moraciæ & moracillæ	
malus cotonea	59	nuces	103
malus generosa	49	moria	86
malus insita	49	mororum ordo	97
malus medica	57	morosycon	94
malus Persica	57.63	morus AEgyptia	93
malus præcox	49.62	morus arbor	97
malus punica	55	moschocaryon	104
malus serotina	49	Muscum radici talea-	
mammosa pyra	67	rum circundare	43
massilienses ficus	96	muscus	23
matrix	23	mustea mala	61

mustea poma	54	oculi	25
mustum,oleum	91	Odorata nux	101.105
N		Oe	82
Naxea amygdala	104	Olea	86
Neapolitana mala	61	olea AEthiopica	87
nebrides	89	olea conditanea,& con-	
nespilus	83	ditiua	88
Nodi	23	oleaginus	87
Nucamenta	28	oleagnus	87
nuces meraciæ	103	oleaster	86
nuces ocellatæ	102	oleitas	90
nuciperfica	64	oleriarbores	15
nucipruna	72	oletum	85
nucleus nucis	102	oleum	89.90
nucum ordines	99	oleum cibarium	91
nutrix	9	oleum gleucinum	91
nux auellana	100	oleum Hispanum	92
nux græca	100	oleum omphacinum	92
nux heracleotica	103	oleum Sabinum	92
nux indica	101	oleum secundarium	91
nux muscata	104	oleum tortium	91
nux myristica & vn-		oliua	88
guentaria	101	oliua Licinia	89
nux odorata	101.105	oliua pausia	88
nux pontica	103	oliuæ Colymbades	89
nux prænestina	103	oliuæ omphacæ	92
nux regia	100	oliuæ orchites	88
nux Tarentina	102	oliuæ strictiæ	90
O		oliuarius,olearius	90
Ocellatæ nuces	102	oliuerus	86
		oliuetum	85

H.ij.

oliuitas	90	Pectines	22
olynthi	96	pedicularia pruna	74
Omphacinū oleū	92	pediculus	26
Onychina pruna	72	pelagia ficus	95
Operire arbores	37	pelusiana poma	51
opisthocarpion	95	percipere fructū ex ar-	
oporothea	47	boribus	27
Orbiculata poma	51	persea arbor	65
orchas	88	persica corboliana	63
orchites oliuæ	88	persica malus	57.63
ordinaria semina	9	persica trecacina	62
ordines nucum	99	persicum popolare	63
ordo cornorum	81	persicus, arbor	63
ordo sorborum	82	pertigona pruna	74
ordo mespilorum	82	petiolus	26
ordo mororum	97	petisia poma	52
ordo prunorum	71	Pheicx	96
orthomastica poma	51	φηλευτίγια	29
Ossa persici	63	φίλλορ	26
ostum	91	Pistacia	105
Oxymala persica	59	pitirides	89
P		Plantæ	9
Palmites bigēmes	25	plantæ arborescētes	14
pampini, & pampinare		plantalia	29
vites	21	plantare	32
paniculæ	28	plantaria	9
pannucea poma	51	plantarium	ibidem
paradisiana poma	52.53	Poma acida	54
partes arboris	17	poma Adami	57
passipoma	53	poma appiana	50
pausia	88	poma aultera	52

poma castinia	54	tes ficus	97
poma Claudiana	50	præcox malus	49
poma conditiua	51	præcoces ficus	96
poma francetura	54	prænestinæ nuces	103
poma gemella	51	pressum	63
poma Hierosolymita-		prodromi	97
na	54	pruna amygdalina	72
poma lanata	50	pruna armeniaca	72
poma lapidosa	52	pruna asinina	71
poma Manliana	50	pruna cæreola	74
poma mirabilia	54	pruna damascena	72
poma nuptialia	57	pruna hordearia	71
poma orbiculata	51	pruna iberica	74
poma paradisiانا	52.53	pruna Iuliana	75
poma purpurea	54	pruna malina	72
poma rambura	53	pruna noberdiana	75
poma ratelliana	53	pruna onychina	72.74
poma renetia	53	pruna pedicularia	74
poma serica	50	pruna persica	59
pomarium	44.46	pruna purpurea	74
pomea lora	66	prunodactyla	74
pomifera arbor	13	prunorum ordo	71
pomœrium	47	prunorum syluestriū &	
pomorum seminaria	10	domesticorū fructus	
pomponiana pyra	67		71
pomum	47.48	prunus	71
ponere plantas	33	prunus AEgyptia	73
pontica nux	103	Pulluli, pulli pullu-	
Præcoqua, siue præ-		lare, pullulascere.12	
cox malus	62	pulmonea poma	51
præcoquæ & præcurrē-		pulpa	23

H.iiij.

purpurea poma	54	pyrorum differentia ac	
putamen nucis	102	fructus	65
putare arbusculas	40	pyrus arbor	65
Pyra angustiana	70	pyrus satiua, & sylue-	
pyra bergamota	70	stris	65
pyra bicipitia	69	Q	
pyra bonchrestiana	68		
pyra callionia, vel cal-		Quicūcialis figura	34
culosa	68	R	
pyra Campanica	69		
pyra certoliana	69	Radicare	19
pyra chia	68	radius	89
pyra crustumina	66	radix	17
pyra Decumiana	67	radix capillata	18
pyra Dolabelliana	67	radix cauernosa	18
pyra falerna	67	radix corticosa	19
pyra finora	69	radix geniculata	18
pyra mammosa	67	radix limosa	18
pyra Mariana	68	rambura poma	53
pyra Martiniana	69	rami	23
pyra moschata	68	ramus frondosus	24
pyra Pomponiana	67	ratelliana poma	53
pyra præcocia	70	Regia nux	100
pyra rosata	69	renetia poma	53
pyra ferotina	67	Rhoa	56
pyra strangulanea	70	Rūcare & fodere fe-	
pyra superba	66	minarium	12
pyra Syria	67	S	
pyra tofacea	70		
pyra volema	67	Sabinum oleum	92
pyrea	66	salgama	48
pyromela	54	salictum	11
		sarrire	40
		sarrire & excolere fe-	
		minarium	12

fatiua pyrus	65	Soboles	21
Scrobem facere	37	forborum ordo	82
scrobes	38	forbus arbor	82
scrobiculi	ibidem	Spadonea poma	51
Sebesten	73	spadix	24
secos	86	σπίγματα	9
secundarium oleum	91	splanchnos	23
semina	8	spoliare arborem fru-	
semina ordinaria	9	ctu	27
feminaria arbutiua	4	Stirpes arborum	30
feminaria pomorū	10	stolæ	21
feminaria vitiaria	4	strictiux oliuæ	90
feminaria vlmorum	10	struthia mala	60
feminarium	8	Subarare radicem	19
feminarium reip.	8	subigere scrobes	38
Catilinarium	12	suffrutices	16
femine inferere	42	furculare plantas	38
ferere arbores	32	furculosi rami	25
ferere taleis	29.43	furculus	24
serica	73	Sycaminea	97
serinæ ficus	96	sycaminus	94.99
serotina malus	49	fycea arbor	97
serotina pyra	67	sycomorus	94
serotinæ ficus	96	sylua Alcinoi	46
sessiana cerasia	77	syluatica pyrus	65
setania	83	syluestris planta	32
Sicasmos	93	syluestris pyrus	65
sicos	93	syrica	50
fidion	56	T	
siliqua dulcis	80	Tabulata	24
siliqua Græca	80	talea	29
siræum	97	taleis ferere	29.43
		H.iiij.	

tarentina nux	102
tarentina pyra	67
tarentum molle	103
tenuis tunica	22
termes	24.86
terminare	24
tessera, tessella	30
Thelicrania	81
thyia	58
Tiburtina poma	51
tiburtinae ficus	96
Tortium oleum	91
Traduces	41
tradux	29
transferre arbores	41
trecacina persica	62
tricoccos	84
triganium	84
trudere gemmas	26
truncus	20
triossum	84
Tunica tenuis	22
turiones	30

V

Vergeria	10
vetula & nouella ar-	
bor	13
Virga	30
virga malleolaris	25.30
virgulta	30
viscum	73
vites arbutiuæ	15
vitex	87
vitiaria seminaria	4
viua radix	18
viuiradices	29
Vlmorum seminaria	

IO

Vnedo	16
Volema pyra	67

X

Xylocerata	80
ξύλοι	29
xylomacer	101

Z

Zizipha	50
---------	----

INDEX GALLICVS.

Abricot	61	cerneaux de noix	102
abricotier	61	Cidre	66
Affier, afficher	33.43	citrons	58
affier par troncons	29	Codinac de Lyon	60
Amandes	101	coigner	59
amandier	101	coignesses	60
Apricotz	72	coings sauuaiges	61
Arbre portant pomes	13	coquille de noix	102
arbre uieil ou ieune	13	cormes	83
arbreaulx	14	cormier	82
Auant pesches	62	corneilles	82
auelines	103	cornoillier	81
B		coucher les cyons	43
Bailler iour, ou bailler		couldre	100
sollaige	41	couldroye	100
balustres	56	Cueur de l'arbre	23
Beaulx arbres & bien		cueurs	78
cultinez	13	cuisse de noix	102
bescher au pied	36	curer	40
Bourion	26	D	
bourionner	26	Dauesnes	72
boutonner	25	Deschausser	37
boutons	25	E	
boys	22	Encaiger, ou entourer	
C		les plantes	36
Cerifaye	10.75	ente	42
cerises	77	enter	30.42
cerises heaulmees	79	enter en bouton	42
cerisier	75	enter en escorce	42

enter en escusson 43
 enter en fente 42
 enterrer les plantes 43
 Esbrancher 39
 escorce 22
 escorce de grenade 56
 escorcer, oster la peleur 38

esmonder 40
 essarter 41

F

Faire branches 13
 faire les fosses pour planter 38
 Fignes de carefme 96
 figuier 93
 Fleur 26

G

Gluz 73
 Grenades aigres 56
 grenades doulces 56
 Greffe 29
 Guernier aux pommes 47
 guindoules 50
 guindoulier 50
 guynnes 78

H

Heaulmes 79
 heaulmiers 79
 Houx 11

I

Iuiubes 50

L

Lescalle dune noix 102
 Lieu planté darbres 15
 limon 59

M

Maistresse racine 18
 Melapi 51
 melo codognio 60
 menu boys 30
 merises 78
 mestlier 83
 mettre de la mousse au-
 tour de la racine 43
 meures 99
 meurier 97
 Mousse 23

N

Neffle 84
 nefflier 83
 Noisettes, noiselles 103
 noix de galle 28
 noix dinde 105
 noix mugnette 104
 noyau 63
 noyer 99

O

Oliue 88
 olivier 86

P			
Passepommes	53	pomme de grenade	55
Peleure	27	pommepoires	54
pepin	102	pommes d'amours	55
peré	66	pommes de boys	52
pesches de corbeil	63	pommes de chastignier	54
pesches de Troyes	62	pommes de coing	59
peschenoix	64	pommes de courpendu	53
Picquer	33.43	pommes de francestu	54
pions	21	pommes de garde	51
Planter	32	pommes de malingre	54
plantes	8	pommes de rambour	53
plantes franches	33	pommes de rateau	53
Poires a deux testes	69	pommes de renette	53
poires bergamotes	70	pommes de rouveau	54
poires dangouisse	70	pommes destranguillon	52
poires de bonchrestien	68	pommes franches	52
poires de calliot	68	pommes gemelles	51
poires de certeau	69	pommes meures	52
poires de chiot	68	pommes pierreuses	52
poires de fin or	69	pommeraye	46
poires de hastineau	70	pommier de deux portees	49
poires de nostre dame	68	pommier enté	49
poires de saint Martin	69	pommier franc	49
poires de tuffé	70	pommier hastif	49
poires destranguillon	70	pommier sauuaige	49
poires musquettes	68	pommier tardif	49
poires sauuaiges	66	pommiers	46.47.49
poires tardifues	67	Prendre racine	19
poirier sauuaige	65	presse	63
poittrons	72	pressorier	90
pomme	47	prunelles	71
		prunellier	71

prunes	71	S	
prunes blanches	74	Sarbousses	16
prunes dattes	74	sarpe	39
prunes de damaz	72	saufaye	11
prunes de Iozas	72	sauuageaulx	8.33
		Seue	23
		Souche	20
Q		Syons	30
Queue	26		
		T	
R		Tailler des cyons	38
Racine	17	taillis	11
Rechauffer	37	transplater les arbres	41
reietton	21	tronc	20
reonner	33	troncon	29
reonneurs	33		
repionner	21	V	
refes	33	Vergers	10

EXCVDEBAT ROB. STEPHANVS

PARISIIS, ANN. M. D. XXXVI.

XII. CAL. IVLII.

QVAEDAM ERRATA POST IAM IMP-
pressum libellum animaduerſa, ſic emendabis.

- | | | |
|----------|---|-------------------------------------|
| Folio 4. | linea 1. | eorum ſtudia |
| fo. 8. | lin. 26. | cap. 10. |
| fo. 20. | lin. 10. | aut caudicis |
| fo. 35. | lin. 16. | germinant, <i>des oeillettons</i> : |
| fo. 34. | super figura decuſſis malè ſcriptum eſt
deunx. ipſa tamen declaratio te facile
docet quo pacto ſit legendum, nobis
etiam non admonentibus. | |
| fo. 47. | lin. 14. | inaugurato |
| fo. 51. | lin. 16. | Sidonte |
| fo. 60. | lin. 24. | appellat, |
| fo. 61. | lin. 6. | & ſuauiora, |
| | lin. 25. | bolum armenium, |
| fo. 77. | lin. 18. | appreſſo, parte |
| fo. 80. | lin. 9. | <i>delle carobbé.</i> |
| fo. 85. | lin. 24. | ſetaniā, gallicā, |
| fo. 95. | lin. 18. | nāſcitur |

Plura ſi quis comperiat, ea, vt æquum & bene-
uolum lectorem decet, emendet apud ſe : neque
verò tam iniquo animo ferat, quaſi id omnibus
non ſit commune quotidie, errare.

